

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	PLACDENT ® (Eritrosina)
Forma farmacéutica:	Tableta masticable
Fortaleza:	20 mg
Presentación:	Caja por 3 bolsas dobles de PEBD con 500 tabletas masticables cada una.
Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:	EMPRESA LABORATORIOS MEDSOL, La Habana, Cuba.
Fabricante (es) del producto, ciudad (es), país (es):	EMPRESA LABORATORIOS MEDSOL, La Habana, Cuba. UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE (UEB) "REINALDO GUTIÉRREZ", Planta "Reycon". Producto terminado
Número de Registro Sanitario:	M-16-100-V04
Fecha de Inscripción:	18 de mayo de 2016.
Composición:	
Cada tableta masticable contiene:	
Eritrosina 87% E-127 CONACERT	20,0 mg
Lactosa monohidratada	
315,07 mg	
Plazo de validez:	24 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C.

Indicaciones terapéuticas:

Descubrimiento de placas bacterianas.

Contraindicaciones:

Contiene lactosa, no administrar a pacientes con intolerancia a la lactosa.

Precauciones:

Pacientes con Diabetes Mellitus.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

No presenta.

Efectos indeseables:

Pacientes con deficiencia de la enzima lactasa pueden presentar: dolor abdominal, diarrea, distensión, flatulencia.

Estos efectos también pueden aparecer en pacientes que hayan ingerido una cantidad excesiva de lactosa.

Posología y modo de administración:

INSTRUCCIONES PARA SU USO:

PLACDENT® debe ser triturado entre los dientes y dejar disolver lentamente en la boca. Con movimiento de la lengua llévelo sobre la superficie de los dientes y encías.

Después de realizada esta operación y previo enjuague de la boca, observe las áreas coloreadas más intensamente.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No presenta.

Uso en Embarazo y lactancia:

No procede.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No procede.

Sobredosis:

Medidas generales.

Propiedades farmacodinámicas:

ATC: V04CX

Grupo Farmacoterapéutico: Agentes diagnósticos, Otros agentes diagnósticos, Otros agentes diagnósticos.

Es un revelador de placas bacterianas. Actúa mediante un fenómeno superficial que trabaja concentrando una sustancia colorante sobre la superficie de los dientes donde existen caries, sarro acumulado o en proceso de formación y en zonas mal cepilladas.

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

La lactosa es hidrolizada por la lactasa en el intestino delgado a glucosa y galactosa, las cuales son absorbidas.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No procede.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 31 de octubre de 2022.