



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO HOMEOPÁTICO

Nombre del producto: TratHo® Dengue

Origen del material de partida: Biotecnológico, vegetal y mineral.

Forma farmacéutica: Gotas sublinguales

Grado de dilución o potenciación: 30 CH

200 CK

Presentación: Estuche por un frasco gotero de polietileno de baja densidad blanco con 5 mL o 10 mL.

Estuche por 12 frascos goteros de polietileno de baja densidad blancos con 5 mL o 10 mL cada uno.

Titular, país: EMPRESA LABORATORIO AICA, La Habana, Cuba.

Fabricante, país: EMPRESA LABORATORIOS AICA, La Habana, Cuba.

UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE (UEB) Laboratorios " Julio Trigo "

Número de Registro Sanitario: H-21-078-V03

Fecha de Inscripción: 10 de diciembre de 2021.

Material de partida:

Tintura madre homeopática a partir de las Reglas de preparación Hahnemannianas 1/100 y Korsakovianas de *Bacillinum*, *Bryonia alba*, *Crotalus horridus*, *Eupatorium perfoliatum*, *Gelsemium sempervirens*, *Phosphorus*, *Solanum dulcamara*, *Tuberculinum aviare*.

Plazo de validez: 12 meses

Condiciones de almacenamiento: Almacenar por debajo de 30° C.

No refrigerar.

Protéjase de la luz.

Usos recomendados:

Medicamento Homeopático recomendado como tratamiento complementario en enfermedades virales con síntomas de fiebre, cefalea, debilidad física, dolores músculo-esqueléticos y otros síntomas compatibles con Dengue.

La acción clínica de cada componente para el uso recomendado es la siguiente:

Componente	Coadyuva al tratamiento de:
<i>Bacillinum</i>	Fiebre, dolor de cabeza, tos, síntomas respiratorios, astenia
<i>Bryonia alba</i>	Dolor osteo-muscular, fiebre, debilidad física,

	irritabilidad.
<i>Crotalus horridus</i>	Hemorragia, dolores musculares persistentes, diarrea, fiebre, rash.
<i>Eupatorium perfoliatum</i>	Dolor de cabeza, dolor retro-orbital y osteo-articular, fiebre,
<i>Gelsemium sempervirens</i>	Escalofríos, náuseas y vómitos.
<i>Phosphorus</i>	Sangramiento
<i>Solanum dulcamara</i>	Debilidad física, dolor de cabeza, fiebre, temblores
<i>Tuberculinum aviare</i>	Dolor de cabeza, síntomas relacionados con resfriados, frialdad

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes.

Precauciones:

El uso de este producto no excluye, sustituye o limita la aplicación de otros tratamientos. Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que en niños menores de 10 años, embarazo, lactancia, geriatría y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluirlo en ¼ vaso de agua.

Advertencias especiales y precauciones de uso.

No manipular o administrar este producto en presencia de olores fuertes (perfume, tabaco, ambientadores, mentol, desinfectantes, etc.). No administrar junto con comidas o bebidas. Se recomienda, no fumar, beber, comer o lavarse los dientes 20 minutos antes y después de la administración. Mantener alejado de equipos electrónicos que generen ondas electromagnéticas fuertes (televisores, microondas, computadoras, celulares, radios, teléfonos inalámbricos, refrigeradores, etc). En caso de aparición de síntomas severos asociados a los usos recomendados u otros signos no relacionados, se debe acudir al médico.

Efectos indeseables:

No se han descrito.

Posología y modo de administración.

Se recomienda la administración de una dosis (5 gotas) 4 veces al día durante al menos 5 días. En caso de agudización de los síntomas, puede administrarse una dosis (5 gotas) cada 1 h y luego, en la medida en que se alcance la mejoría, disminuir gradualmente la frecuencia hasta la posología recomendada de 4 dosis diarias. Se recomienda no exceder los 21 días de tratamiento. Durante el tratamiento deben respetarse los horarios de sueño.

Interacciones con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No se han descrito

Uso en Embarazo y lactancia.

Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que en niños menores de 10 años, embarazo, lactancia, geriatría y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluirlo en ¼ vaso de agua.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias.

No se han descrito.

Sobredosis:

No se han descrito

Otras propiedades atribuidas o demostradas.

No se han reportado hasta la fecha.

Instrucciones de uso y manipulación del producto.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

Antes de administrar cada dosis se sugiere golpear al menos 10 veces el frasco contra la palma de la mano. Se recomienda la administración sublingual con la boca completamente limpia y libre de olores fuertes y cualquier sabor. Por lo que no se debe comer, beber, cepillarse los dientes ni fumar 20 minutos antes o después de la administración del medicamento. En caso de administrar el producto diluido en agua potable (1/4 vaso), este se debe retener en la boca durante 5 segundos garantizando el contacto sublingual. Se recomienda además evitar el contacto del cuentagotas, el interior de la tapa o el medicamento con las manos o labios. Se sugiere dispensar previamente cada dosis (5 gotas) en la tapa del frasco y luego administrar debajo de la lengua.

Fecha de aprobación/revisión del texto: 10 de diciembre de 2021.