

## RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

<b>Nombre del producto:</b>	VINYLINUM® (Éter polivinil butílico)
<b>Forma farmacéutica:</b>	Solución oral y tópica
<b>Fortaleza:</b>	91,7 g
<b>Presentación:</b>	Estuche por un frasco de vidrio ámbar con 50 mL. Estuche por un frasco de vidrio ámbar con 100 mL.
<b>Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:</b>	ARG GROUP INC., Ciudad de Panamá, Panamá.
<b>Fabricante (s) del producto, ciudad (es), país (es):</b>	1- JSC "PLANTA CHIMREACTIVCOMPLEKT ", Moscú, Federación Rusa. Producto terminado. 2- EMPRESA LABORATORIO FARMACÉUTICO LIQUIDOS ORALES MEDILIP, Bayamo, Cuba. Acondicionador.
<b>Número de Registro Sanitario:</b>	M-06-090-D03
<b>Fecha de Inscripción:</b>	14 de junio de 2006.
<b>Composición:</b>	
Cada 100 mL contiene:	
Éter polivinil butílico	91,7 g
<b>Plazo de validez:</b>	60 meses
<b>Condiciones de almacenamiento:</b>	Almacenar por debajo de 25 °C. Protéjase de la luz y la humedad.

### Indicaciones terapéuticas:

Externo: Furúnculos, carbúnculos, úlceras tróficas, heridas purulentas, mastitis, lesiones de tejidos blandos, quemaduras, dermatitis y enfermedades inflamatorias de la piel.

Interno: Gastritis, acidez, úlceras de duodeno y del estómago.

### Contraindicaciones:

Hipersensibilidad individual.

Embarazo. Lactancia.

Menores de 18 años.

Enfermedad del hígado y vesícula

### Precauciones:

No se han reportado hasta la fecha.

**Advertencias especiales y precauciones de uso:**

No se han reportado hasta la fecha.

**Efectos indeseables:**

Raramente hipersensibilidad individual al medicamento: posibles reacciones alérgicas, sobre todo de carácter local.

**Posología y modo de administración:**

Externo: Apósito húmedo aplicado directamente en piel en cantidad suficiente hasta que desaparezca la lesión.

Interno: se recomienda una vez al día pasadas 5-6 horas después de la última toma de alimentos.

En caso de úlceras del duodeno y del estómago: 1 cucharadita (5 mL) durante 16-20 días.

En caso de acidez o gastritis una cucharadita (5 mL) durante 10 o 12 días.

**Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:**

No se han reportado hasta la fecha

**Posible interferencia con test de diagnóstico:**

No se han reportado hasta la fecha

**Uso en Embarazo y lactancia:**

No debe administrarse ni en el embarazo ni durante el periodo de lactancia.

**Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:**

No procede.

**Sobredosis:**

No se han reportado hasta la fecha.

**Propiedades farmacodinámicas:**

Código ATC: D03

A02

Grupo farmacoterapéutico: Antiácidos drogas para el tratamiento de la úlcera péptica y carminativos.-Preparados para el tratamiento de heridas y úlceras.

Antiséptico, favorece la depuración, regeneración del tejido y epitelio de las heridas.

Por ingestión oral: Cubre el tracto digestivo favoreciendo una disminución de la acidez, balanceando el Ph, reduciendo la proliferación de bacterias, además posee efecto antiinflamatorio.

**Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):**

No se reporta en la bibliografía.

**Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:**

No procede.

**Fecha de aprobación/ revisión del texto:** 30 de abril de 2022.

