

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO HOMEOPÁTICO

Nombre del producto: AliviHo[®] - Trauma.

Origen del material de partida: Animal, vegetal y mineral.

Forma farmacéutica: Gotas sublinguales.

Grado de dilución o potenciación: 7 CH – 30 CH

Presentación:

Estuche por un frasco gotero de polietileno de baja densidad blanco con 5 mL o 10 mL.

Estuche por 12 frascos goteros de polietileno de baja densidad blancos con 5 mL o 10 mL cada uno.

Titular, dirección país:

Empresa Laboratorios AICA. Unidad Empresarial de Base (UEB) “Laboratorios Julio Trigo” Carretera Vieja de Vento No. 17124 entre Camino Nuevo y Lindero, Boyeros, La Habana. Cuba.

Número de Registro Sanitario: M-18-022-V03

Fecha de inscripción: 6 de marzo de 2018

Material de partida:

Tintura madre homeopática a partir de las Reglas de preparación Hahnemannianas 1/100 de *Arnica montana*, *Bellis perennis*, *Bryonia alba*, *Calcarea phosphorica*, *Conium maculatum*, *Hypericum perforatum*, *Ledum palustre*, *Natrum sulfuricum*, *Ruta graveolens*, *Symphitum officinale*, Rescue remedy (Complejo de esencias florales) en solución hidroalcohólica al 30%

Plazo de validez: 24 meses.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar por debajo de 30 °C. No refrigerar. Protéjase de la luz.

Usos recomendados:

Se recomienda como tratamiento analgésico auxiliar para dolores agudos como consecuencias de contusiones, hematomas, luxaciones, secuelas de caídas, golpes, fracturas y otros traumas mecánicos.

Componentes de la formulación y sus síntomas según patogenesia que coadyuva al tratamiento indicado:

Componente	Coadyuva al alivio de:
<i>Arnica montana</i>	Dolor agudo, inflamación
<i>Bellis perennis</i>	Contracturas musculares, hematomas, dolor post-traumático, luxaciones.
<i>Bryonia alba</i>	Dolores articulares
<i>Calcarea phosphorica</i>	Torceduras, fracturas
<i>Conium maculatum</i>	Debilidad muscular
<i>Hypericum perforatum</i>	Dolores postraumáticos y post-operatorios, heridas, mordeduras
<i>Ledum palustre</i>	Hematomas, heridas no cicatrizadas, cortaduras, rasguños
<i>Natrum sulphuricum</i>	Cambios mentales y emocionales después de traumas,
<i>Ruta graveolens</i>	Esguinces, torceduras
<i>Symphytum officinale</i>	Dolores punzantes, lesiones oculares, fracturas
Rescue remedy (Complejo de esencias florales)	Situaciones traumáticas físicas y mentales

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al medicamento o a alguno de sus componentes.

Precauciones:

El uso de este producto no excluye, sustituye o limita la aplicación de otros tratamientos. Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que, en caso de embarazo, lactancia, niños menores de 10 años y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluir la dosis (5 gotas) en ¼ vaso de agua potable.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

No manipular o administrar este producto en presencia de olores fuertes (perfume, tabaco, ambientadores, mentol, desinfectantes, etc.). No administrar junto con comidas o bebidas. Se recomienda, no fumar, beber, comer o lavarse los dientes 20 minutos antes y después de la administración. Mantener alejado de equipos electrónicos que generen ondas electromagnéticas fuertes (Televisores, microondas, computadoras, celulares, radios, teléfonos inalámbricos, refrigeradores, etc.). En caso de aparición de síntomas severos asociados a los usos recomendados u otros signos no relacionados, se debe acudir al médico.

Efectos indeseables:

No se han descrito hasta el momento.

Posología y modo de administración.

Se recomienda la administración de una dosis (5 gotas) 4 veces al día durante al menos 5 días. En caso de agudización de los síntomas, puede administrarse una dosis (5 gotas) cada 1 h y luego, en la medida en que se alcance la mejoría, disminuir gradualmente la frecuencia hasta la posología recomendada de 4 dosis diarias. Se recomienda no exceder los 21 días de tratamiento. Durante el tratamiento deben respetarse los horarios de sueño.

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacciones:

No se han descrito hasta el momento.

Uso en Embarazo y lactancia.

Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que, en niños menores de 10 años, Embarazo, Lactancia, Geriatria y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluirlo en ¼ vaso de agua.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias.

No se han descrito hasta el momento.

Sobredosis: Medidas generales.

Otras propiedades atribuidas o demostradas:

No se presentan.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

Antes de administrar cada dosis se sugiere golpear al menos 10 veces el frasco contra la palma de la mano. Se recomienda la administración sublingual con boca completamente limpia y libre de olores fuertes y cualquier sabor. Por lo que no se debe comer, beber, cepillarse los dientes ni fumar 20 minutos antes o después de la administración del medicamento. En caso de administrar el producto diluido en agua potable (1/4 vaso), este se debe retener en la boca durante 5 segundos garantizando el contacto sublingual. Se recomienda además evitar el contacto del cuentagotas, el interior de la tapa o el medicamento con las manos o labios.

Fecha de aprobación/revisión del texto: 6 de marzo de 2018.