

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	ANESTOP ® (Clorhidrato de lidocaína)
Forma farmacéutica:	Ungüento
Fortaleza:	--
Presentación:	Estuche por 1 tubo de AL con 25 g.
Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:	EMPRESA LABORATORIO FARMACÉUTICO "ROBERTO ESCUDERO", Artemisa, Cuba.
Fabricante (s) del producto, ciudad (es), país (es):	EMPRESA LABORATORIO FARMACÉUTICO ROBERTO ESCUDERO, Artemisa, Cuba. UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE (UEB) Producción Estomatológicos y Dispensariales. Producto terminado.
Número de Registro Sanitario:	M-17-053-A01
Fecha de Inscripción:	31 de marzo de 2017
Composición:	
Cada 100 g contiene:	
Clorhidrato de lidocaína	5,0 g
Plazo de validez:	36 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30°C.

Indicaciones terapéuticas:

Anestesia Tópica previa a la infiltración.
Extracción de dientes caducos y de dientes flojos.
Detartrajes.
Adaptación de coronas.
Eliminación de reflejos en la toma de impresiones.
Anestesia de la dentina y la pulpa expuesta.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al Clorhidrato de Lidocaína

Precauciones:

No presenta.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

Embarazo: cruza la barrera placentaria. Categoría de riesgo para el embarazo B

Efectos indeseables:

No presenta.

Posología y modo de administración:

Según facultativo.

Modo de administración: Tópica

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

Con soluciones desinfectantes puede causar liberación de metales pesados de estas soluciones y producir irritación cutánea.

Uso en Embarazo y lactancia:

Embarazo: cruza la barrera placentaria. Categoría de riesgo para el embarazo B

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No procede.

Sobredosis:

No procede.

Propiedades farmacodinámicas:

Código ATC: DO4AB02

Grupo Farmacoterapéutico: Dermatológicos, Antipruriginosos incl. Antistamínicos y anestésicos, Anestésicos para uso tópico

No presenta.

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

No presenta.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

Seque previamente la mucosa y aplique el Ungüento en cantidad suficiente para cubrir la zona, frote sobre la misma con una torunda de algodón o con la yema del dedo.

El efecto anestésico se produce pasado 1 minuto, con una duración aproximada de 20 minutos.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 30 de mayo de 2023.