

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	TATFARM® BÁLSAMO RUSO (Éter polivinil-butílico)
Forma farmacéutica:	Solución oral y tópica
Fortaleza:	91,05 - 92,3 g/100 mL
Presentación:	Estuche por un frasco de vidrio ámbar con 50 g.
Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:	TATCHEMPHARMPREPARATY SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (TATCHEMPHARMPREPARATY S.A.A.), Ciudad de Kazán, Rusia.
Fabricante (s) del producto, ciudad (es), país (es):	TATCHEMPHARMPREPARATY SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (TATCHEMPHARMPREPARATY S.A.A.), Ciudad de Kazán, Rusia. Producto terminado.
Número de Registro Sanitario:	M-24-024-D03
Fecha de Inscripción:	23 de mayo de 2024
Composición:	
Cada 100 mL contiene:	
Éter polivinil-butílico	91,05 - 92,3 g
Plazo de validez:	60 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 25°C. Protéjase de la luz.

Indicaciones terapéuticas:

Uso Tópico: Furúnculos, carbúnculos, úlcera trófica, heridas purulentas, mastitis, lesiones de tejidos blandos, quemaduras incluyendo quemaduras por congelación

Uso Oral: gastritis, acidez, úlceras de estómago y del duodeno

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a polyvinox

Enfermedades de hígado, vesícula biliar y renal

Precauciones:

Menores de 18 años

Advertencias especiales y precauciones de uso:

No se han reportado.

Efectos indeseables:

Posible reacción alérgica.

Posología y modo de administración:

Uso tópico:

Apósito húmedo aplicado directamente en piel 2-3 veces al día hasta que desaparezca la lesión.

Uso oral:

Una vez al día pasadas 5 – 6 horas de la última toma de alimentos (se recomienda una cena ligera sobre las 6 de la tarde y administración de medicamento sobre las 11- 12 pm).

En caso de úlceras del duodeno y del estómago: 1 cucharada diaria durante 16 – 20 días.

En caso de acidez o gastritis: 1 cucharada días alternos durante 10 – 12 días.

Interacciones con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No se han reportado.

Uso en Embarazo y lactancia:

No se debe administrar ni en el embarazo ni durante el periodo de lactancia

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No se han reportado.

Sobredosis:

No se han reportado.

Propiedades farmacodinámicas:

Código ATC: D03

Grupo farmacoterapéutico: D: Dermatológicos: D03: preparados para el tratamiento de heridas y úlceras.

Antiséptico, favorece la depuración, regeneración del tejido y epitelio de las heridas.

Por ingestión oral: Cubre el tracto digestivo favoreciendo una disminución de la acidez, balanceando el Ph, reduciendo la proliferación de bacterias, además posee efecto antiinflamatorio.

Propiedades farmacocinéticas (absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

No se han reportado hasta la fecha.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No procede.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 23 de mayo de 2024.