

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	ZINC
Forma farmacéutica:	Crema
Fortaleza:	100,0 mg/g
Presentación:	Estuche por 1 tubo de AL con 25 g.
Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:	SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA "FÁBRICA DE MEDICAMENTOS BORÍSOV", Borísov, República de Belarús.
Fabricante (es) del producto, ciudad (es), país (es):	SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA "FÁBRICA DE MEDICAMENTOS BORÍSOV", Borísov, República de Belarús. Producto terminado.
Número de Registro Sanitario:	016-25D3
Fecha de Inscripción:	28 de marzo de 2025
Composición:	
Cada g contiene:	
Óxido de zinc	0,1 g
Plazo de validez:	60 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C.

Indicaciones terapéuticas:

La crema de Zinc es la crema para uso externo, está indicada para:

Tratamiento y prevención de la dermatitis del pañal;

Tratamiento de dermatitis, eczema, escoceduras;

Tratamiento de las lesiones de la piel (pequeñas quemaduras térmicas y solares, cortes, rasguños).

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes del medicamento;

Enfermedades purulentas e inflamatorias de la piel y los tejidos adyacentes.

Precauciones:

Ver Advertencias.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

La crema es solo para uso externo.

No lo use en caso de enfermedades pústulas de la piel.

La crema solo debe aplicarse a áreas de la piel no infectadas.

No permita que la crema entre en contacto con las membranas mucosas y los ojos. En caso de que la crema entre en contacto con los ojos, debe enjuagarlos con abundante agua corriente y consultar a un médico.

Si la dermatitis del pañal en un niño no desaparece dentro de los 7 días posteriores al inicio del medicamento, debe interrumpir el tratamiento y consultar a un médico nuevamente.

Efectos indeseables:

Durante el uso de la crema de Zinc, es posible desarrollar reacciones de hipersensibilidad a la crema, incluyendo picazón, hiperemia, erupción cutánea, cambios en el sitio de aplicación de la crema, descamación, dolor, urticaria.

Con el uso prolongado, es posible el desarrollo de la irritación de la piel.

Con el desarrollo de reacciones adversas, debe dejar de usar la crema.

Posología y modo de administración:

Dermatitis, eczema, quemaduras térmicas y solares, cortes, rasguños, escoceduras

La crema se aplica en una capa delgada a las áreas afectadas 3-4 veces al día.

Población pediátrica

El medicamento se usa en la práctica pediátrica.

Dermatitis del pañal en niños

Para la prevención, la crema se aplica a la piel limpia y seca (debajo de los pañales), especialmente antes de acostarse para evitar la aparición de irritación de la piel debido al contacto prolongado con los pañales mojados.

Con fines terapéuticos, la crema se aplica a la piel con una capa delgada 2-3 veces al día (si es necesario, durante cada cambio de pañal) cuando aparecen los primeros signos de hiperemia (enrojecimiento de la piel), escoceduras o irritación leve de la piel.

Duración de la terapia

La duración del tratamiento es determinada por el médico dependiendo de la naturaleza y el curso de la enfermedad.

Vía de administración

El medicamento está diseñado para uso externo.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No se observaron interacciones farmacológicas de la crema de Zinc con medicamentos de acción sistémica.

No hay datos sobre la interacción de la crema de zinc con otros medicamentos tópicos, por lo que no se recomienda su uso simultáneo.

Uso en Embarazo y lactancia:

Embarazo

El uso de la crema durante el embarazo solo es posible cuando el beneficio esperado para la madre excede el riesgo potencial para el feto o del bebé.

Lactancia

El uso de la crema durante lactancia solo es posible cuando el beneficio esperado para la madre excede el riesgo potencial para el feto o del bebé.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

El medicamento no afecta la capacidad de conducir vehículos y maquinaria potencialmente

peligrosa.

Sobredosis:

Una sobredosis es poco probable cuando la crema se aplica tópicamente.

Ingestión accidental del medicamento

Síntomas

Si accidentalmente toma el medicamento por vía oral en grandes dosis, puede experimentar el dolor de estómago, náuseas, vómitos, diarrea, estimulación del sistema nervioso central y convulsiones.

Tratamiento

El tratamiento es sintomático.

Propiedades farmacodinámicas:

Código ATC: D02AB

Grupo farmacoterapéutico: D: Dermatológicos, D02: Emolientes y protectores, D02A: Emolientes y protectores, D02AB: Productos de zinc

Mecanismo de acción

La crema de zinc tiene un efecto astringente, adsorbente y antiséptico, reduce la gravedad de los procesos exudativos.

Cuando se aplica tópicamente, reduce las manifestaciones de inflamación e irritación de la piel, la suaviza y la seca.

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

Con el uso externo, los componentes de la crema prácticamente no se absorben en el torrente sanguíneo sistémico y no muestran acción reabsorbente.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No precede.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 28 de marzo de 2025.