

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	VICK VAPORUB
Forma farmacéutica:	Suspensión oral
Fortaleza:	--
Presentación:	Estuche por 12 latas de AL azul con 12 g cada una. Frasco de PP azul con 50 g. Frasco de PP azul con 100 g.
Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:	LIDO INTERNACIONAL S.A., Colón, Panamá.
Fabricante (es) del producto, ciudad (es), país (es):	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Naucalpan de Juárez, México. Producto terminado.
Número de Registro Sanitario:	060-25D3
Fecha de Inscripción:	23 de mayo de 2025
Composición:	
Cada 100 g contiene:	
Alcanfor	5,26 g
Mentol	2,82 g
Eucalipto	1,33 g
Plazo de validez:	18 meses (lata de AL) 24 meses (frasco de PP)
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C.

Indicaciones terapéuticas:

Para el alivio temporal de la congestión nasal y tos asociados con resfrío.

Usar en pecho y cuello.

Puede aliviar dolores y molestias musculares menores

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

Niños menores de 2 años.

Precauciones:

Si se presenta fiebre o si los síntomas persisten por más de 3 días, consultar al médico.

Evitar el contacto con los ojos.

No ingerir.

Descontinuar el uso si aparece irritación.

No aplicar sobre heridas o piel dañada.

No usar vendajes oclusivos o compresas calientes.

Consultar a su médico previamente si padece o ha padecido anteriormente episodios de convulsiones o epilepsia, asma bronquial o hipersensibilidades respiratorias

Advertencias especiales y precauciones de uso:

No se use en niños menores de 2 años, contiene alcanfor.

Evitar la aplicación en fosas nasales.

Evite el contacto con ojos y mucosas.

Para su uso por vaporización, No calentar directamente o exponer al fuego o calentar en horno microondas.

El uso inadecuado puede causar daños/quemaduras.

En caso de embarazo y lactancia consulte a su médico.

Efectos indeseables:

Irritación o reacciones de hipersensibilidad

Posología y modo de administración:

Mayores de 2 años: Para el alivio temporal de la congestión nasal y tos asociados con resfrío. Usar en pecho y cuello.

Puede actuar de dos maneras:

Por frotación: Aplicar una capa gruesa de VAPORUB en pecho y cuello y frotar. Usar por la noche y/o mañana. Los vapores medicinales que ascienden a la boca y nariz ayudan a la descongestión de las vías respiratorias, facilitando la respiración y calman la tos.

Por vaporización: Ponga 2 cucharaditas en medio litro de agua caliente (que no esté hirviendo), y aspire profundamente sus vapores medicinales durante 10 a 15 minutos. Administrar hasta cuatro veces al día. Usar en niños bajo la supervisión de un adulto.

Descartar el contenido del recipiente después de usarse.

Para el alivio temporal de dolores y molestias musculares menores. Usar sobre los músculos adoloridos. Frotar hasta cuatro veces al día.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No procede

Uso en Embarazo y lactancia:

Embarazo y lactancia, consulte a su médico

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No procede

Sobredosis:

Puede causar irritación en la piel.

Propiedades farmacodinámicas:

Código ATC: R05X

Grupo farmacoterapéutico: R: Sistema Respiratorio, R05: Preparados para la tos y el resfrío, R05X: Otros preparados combinados para el resfrío.

Contiene componentes con propiedades expectorantes y descongestionantes por lo que está indicado para el tratamiento sintomático de las afecciones de las vías respiratorias altas. El alcanfor y el mentol son productos naturales derivados de las plantas, muy conocidos por sus efectos sensoriales. Aunque todavía no se conoce perfectamente el mecanismo de acción a nivel molecular del alcanfor, se ha comprobado que éste activa a otro termo receptor de la familia TRP, provocando una rápida sensación de calor. El salicilato de metilo contribuye al efecto analgésico de los tejidos inflamados. Los aceites

esenciales empleados tópicamente provocan una sensación de calor en la piel similar a la que producen los componentes anteriores. Además, tienen un efecto balsámico y calmante. Al aplicarlos localmente producen dilatación de los vasos sanguíneos de la piel y relajación muscular de la zona afectada favoreciendo la circulación local. Asimismo, estimulan el sistema respiratorio.

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

La absorción sistémica de alcanfor, mentol y salicilato de metilo en humanos es muy baja, alcanzándose concentraciones plasmáticas extremadamente bajas. Además estas sustancias presentan una vida media muy corta (entre 1 y 4 horas) lo que asegura que no se acumularán con el uso continuado de este producto.

El mentol se metaboliza muy rápidamente a nivel intestinal y/o hepático a glucurónido de mentol y se excreta en orina y bilis en forma de ácido glucurónico. El alcanfor y sus metabolitos son excretados principalmente por vía urinaria en forma de glucurónidos. Los salicilatos se excretan principalmente por el riñón. No se han establecido datos sobre la farmacocinética por uso cutáneo de los aceites esenciales.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No procede

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 3 de mayo de 2025.