

## RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

<b>Nombre del producto:</b>	COFAL® FUERTE
<b>Forma farmacéutica:</b>	Crema
<b>Fortaleza:</b>	--
<b>Presentación:</b>	Frasco de PEAD blanco con 60 g Frasco de PEAD blanco con 120 g
<b>Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:</b>	LIDO INTERNACIONAL S.A., Colón, Panamá.
<b>Fabricante (es) del producto, ciudad (es), país (es):</b>	ASPEN PANAMÁ S.A., Colón, Panamá. Producto terminado
<b>Número de Registro Sanitario:</b>	062-25D3
<b>Fecha de Inscripción:</b>	23 de mayo de 2025
<b>Composición:</b>	
Cada 100 g contiene:	
L-mentol	2,857 g
Salicilato de metilo	18,238 g
Alcohol cetostearílico	14,571 g
<b>Plazo de validez:</b>	24 meses
<b>Condiciones de almacenamiento:</b>	Almacenar por debajo de 30 °C

### Indicaciones terapéuticas:

Pre calentamiento muscular, alivio de la inflamación y dolor muscular.

Alivio de golpes y torceduras causados por la práctica deportiva.

### Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

### Precauciones:

No aplicar a niños menores de dos años, aplicar con precaución a niños mayores.

No aplique sobre heridas, piel dañada, irritada o muy sensible, ni en pacientes sensibles al ácido acetilsalicílico, con asma o pólipos nasales.

No aplicar en membranas mucosas.

Si los síntomas empeoran o persisten por más de siete días descontinúe su uso y consulte a su médico.

Si está embarazada o en período de lactancia consulte al médico antes de utilizar este producto.

**Advertencias especiales y precauciones de uso:**

No utilizar vendajes oclusivos.

**Efectos indeseables:**

Irritación en el sitio de aplicación. Dermatitis de contacto.

**Posología y modo de administración:**

Aplicar sobre el músculo de 3 – 4 veces al día como máximo, por un período de 7 días.

**Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:**

No se han reportado.

**Uso en embarazo y lactancia:**

Consulte al médico antes de utilizar este producto.

**Efectos sobre la conducción de vehículos/ maquinaria:**

No se han descrito.

**Sobredosis:** Consulte a su médico o acuda a un centro de control de intoxicaciones inmediatamente.

**Propiedades farmacodinámicas:**

Código ATC: M02A

Grupo Farmacoterapéutico: M: Sistema musculoesquelético, M02: Productos tópicos para el dolor articular y muscular, M02A: Productos tópicos para el dolor articular y muscular.

Analgésico de acción externa que estimula los receptores sensitivos de calor y de frío. Su acción analgésica y rubefaciente, es la responsable de dar alivio temporal a los dolores musculares y de articulaciones asociadas a dolores de espalda, artritis, estiramientos, magulladuras y torceduras.

**Propiedades farmacocinéticas (absorción, distribución, biotransformación, eliminación):**

No presenta.

**Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:**

No procede.

**Fecha de aprobación revisión del texto:** 23 de mayo de 2025.