

RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	PERMETRINA 1%
Forma farmacéutica:	Champú
Fortaleza:	1 %
Presentación:	Estuche por 1 frasco de PVC blanco opaco con 60 mL.
Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:	DISFARMACO SRL, Santo Domingo, República Dominicana.
Fabricante (es) del producto, ciudad (es), país (es):	LABORATORIOS BRITANIA SRL., Santo Domingo, República Dominicana. Producto terminado.
Número de Registro Sanitario:	101-25D3
Fecha de Inscripción:	23 de junio de 2025
Composición:	
Cada 100 mL contiene:	
Permetrina	1,0 g
Plazo de validez:	48 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar de 15 a 30 °C.

Indicaciones terapéuticas:

Indicado para el tratamiento y erradicación de los piojos y ladillas (*Pediculus capitis*, *P. corporis* y *P. pubis*).

Contraindicaciones:

Permetrina champú está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula o a piretroides sintéticos o piretrina

Precauciones:

Ver Advertencias.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

Evitar el contacto con los ojos: Enjuagar abundantemente con agua si accidentalmente se introduce en los ojos.

Si se desarrolla hipersensibilidad, discontinuar su uso. Sensibilidad cruzada y/o problemas asociados:

Los pacientes que no toleran los insecticidas veterinarios que contienen Permetrina, tampoco tolerarán la loción de Permetrina. Además los pacientes que no toleran las piretrinas o crisantemas, pueden no tolerar tampoco esta medicación.

Cuando existe inflamación aguda del cuero cabelludo la loción de Permetrina puede exacerbar la situación.

Efectos indeseables:

Eventualmente puede provocar prurito, eritema y manifestaciones irritativas como ardor que son leves y transitorias.

La sobredosificación tópica aumenta la intensidad de estas manifestaciones y produce sequedad, agrietamiento de la piel y eventualmente manifestaciones de hipersensibilidad cutánea.

Posología y modo de administración:

No se aplique a niños menores de 2 años ni en pacientes con antecedentes de crisis convulsivas ni sobre quemaduras o heridas de la piel.

Tratamiento de piojos de la cabeza y ladillas: Aplicar en el cabello previamente humedecido hasta formar abundante espuma y dejar durante 10 minutos.

Posteriormente enjuagar abundantemente con agua. Si fuera necesario por persistencia de parásitos o liendres el tratamiento puede repetirse 7 a 10 días después.

Es recomendable aplicar a todos los miembros de una familia si existe uno de ellos parasitado para evitar el contagio inadvertido.

Una vez seco el cabello después de la aplicación del medicamento usar un peine de diente cerrado para arrastrar mecánicamente los parásitos muertos y las liendres adheridas al cabello.

Algunos pacientes pueden experimentar prurito persistente después del tratamiento. Esto raramente es un signo de falla del tratamiento y no es indicación para un retratamiento.

Si se demuestra la presencia de parásitos vivos después de 14 días de aplicado el primer tratamiento debe aplicarse un segundo tratamiento. Permetrina Shampoo es efectivo y seguro

Modo de preparación: No Procede.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No se han descrito

Uso en Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Se aconseja administrar a mujeres embarazadas únicamente cuando se haya hecho una valoración riesgo- beneficio.

Lactancia: No se administre durante la lactancia, aunque no se han descrito problemas en humanos y no se conoce si la Permetrina se excreta en la leche materna, en algunos estudios con animales se ha demostrado que tiene potencial tumorigeno

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No se han realizado estudios.

Sobredosis:

En casos de ingestión errónea accidental o con fines suicidas pueden presentarse manifestaciones de intolerancia gastrointestinal (epigastralgia, náusea, vómito, diarrea), ya que es muy poco tóxico para los humanos.

En todo caso deberá efectuarse lavado gástrico y adoptar medidas de soporte para contrarrestar los síntomas.

En caso de reacción tópica discontinuar el tratamiento y aplicar crema suavizante, si hay reacción alérgica cutánea utilizar antihistamínicos orales o corticosteroides tópicos.

Propiedades farmacodinámicas:

Código ATC: P03AC04

Grupo farmacoterapéutico: P: Productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes, P03: Ectoparasitidas, incl. escabicidas, insecticidas y repelentes, P03A: Ectoparasitidas, incl. Escabicidas, P03AC: Piretrinas incl. compuestos sintéticos.

La Permetrina actúa sobre la membrana celular nerviosa del piojo para interceptar la corriente de los canales de sodio que regula la polarización de la membrana. Esto da lugar a retraso de la repolarización y parálisis subsiguiente. Es farmacológicamente activa contra piojos, ácaros, garrapatas y pulgas

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

Absorción: No está determinada con precisión, sin embargo datos preliminares sugieren que menos de un 2% de la cantidad aplicada se absorbe sistémicamente.

La Permetrina se detecta en el cabello en cantidades residuales durante al menos 10 días después de un tratamiento.

Metabolismo: Se metaboliza rápidamente mediante hidrólisis del éster a metabolitos inactivos.

Eliminación: Principalmente en la orina.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No procede.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 23 de junio de 2025.