



RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	COFAL® ORIGINAL
Forma farmacéutica:	Crema
Fortaleza:	
Presentación:	Frasco de PEAD blanco con 35 g Frasco de PEAD blanco con 60 g Frasco de PEAD blanco con 120 g
Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:	LIDO INTERNACIONAL S.A., Colón, Panamá.
Fabricante (es) del producto, ciudad (es), país (es):	INDUSTRIA FARMACÉUTICA ANDRÓMACO S.A. DE C.V., Ciudad de México, México. Producto terminado
Número de Registro Sanitario:	124-25D3
Fecha de Inscripción:	7 de julio de 2025
Composición:	
Cada 100 g contiene:	
L-mentol	1,76 g
Alcanfor	5,86 g
Salicilato de metilo	7,23 g
Plazo de validez:	36 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C

Indicaciones terapéuticas:

Analgésico de acción tópica que estimula los receptores sensitivos de calor y de frío.

Su acción irritante es la responsable de dar alivio temporal a los dolores musculares y de articulaciones asociados a dolores de espalda, artritis, estiramiento, magulladuras y torceduras.

Está indicado para tensión y cansancio muscular, dolor por golpes y torceduras.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

Precauciones:

No aplicar a niños menores de dos años, aplicar con precaución a niños mayores.

No aplique sobre heridas, piel dañada, irritada o muy sensible, ni en pacientes sensibles al ácido acetilsalicílico, con asma o pólipos nasales.

No aplicar en membranas mucosas. Si los síntomas empeoran o persisten por más de siete días descontinúe su uso y consulte a su médico.

Si está embarazada o en período de lactancia consulte al médico antes de utilizar éste producto.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

Contiene alcanfor, no debe usarse para inhalaciones con vapor. No utilizar vendajes oclusivos.

Efectos indeseables:

Irritación y prurito.

Posología y modo de administración:

Aplicar sobre el músculo de 3 – 4 veces al día como máximo, por un período de 7 días.

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No se han reportado.

Uso en embarazo y lactancia:

Consulte al médico antes de utilizar éste producto.

Efectos en la conducción de vehículos/ maquinarias:

No se han descrito.

Sobredosis:

Consulte a su médico o acuda a un centro de control de intoxicaciones inmediatamente.

Propiedades farmacodinámicas:

Código ATC: M02A

Grupo Farmacoterapéutico: M: Sistema músculo esquelético; M02: Productos tópicos para el dolor articular y muscular; M02A: Productos tópicos para el dolor articular y muscular.

Propiedades farmacocinéticas (absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

No se han realizado estudios para investigar el efecto de la edad, pacientes con insuficiencia renal o hepática en la farmacocinética de salicilato de metilo y L-Mentol.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No procede.

Fecha de aprobación/revisión del texto: 7 de julio de 2025.