

RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	VIO CORTEN® (Clioquinol)
Forma farmacéutica:	Crema
Fortaleza:	3 %
Presentación:	Estuche por 1 tubo de AL con 28 g
Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:	LIDO INTERNACIONAL S.A., Colón, Panamá.
Fabricante (es) del producto, ciudad (es), país (es):	LABORATORIOS RIGAR, S.A., Ciudad de Panamá, Panamá. Producto terminado.
Número de Registro Sanitario:	133-25D3
Fecha de Inscripción:	10 de julio de 2025
Composición:	
Cada 100 g contiene:	
Iodoclorohidroxiquinolina (Clioquinol)	3,0 g
Plazo de validez:	24 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C. Protéjase de la luz.

Indicaciones terapéuticas:

Infecciones de la piel bacterianas o fúngicas, otitis externa, dermatitis de diferentes etiologías.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación.
Niños menores de 2 años.

Precauciones:

Puede provocar reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto).
Si las molestias persisten por más de 12 días, se agravan o aparecen nuevas consulte a su médico.
Puede manchar el cabello, la piel o la tela y la aplicación debe cubrirse con un apósito para proteger la ropa.
Si con el uso de este producto ocurre alguna irritación en la piel o cualquier otra reacción inusual, suspenda su uso y consulte al médico.
Embarazo y lactancia deberá consultar con su médico previamente.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

No aplicar sobre heridas abiertas.
Si los síntomas persisten por más de 7 días consulte a su médico.
No exceder la dosis recomendada.
No usar vendajes oclusivos.

Evitar el contacto con la conjuntiva.

Efectos indeseables:

Puede causar irritación severa o hipersensibilidad y puede haber sensibilidad cruzada.

Posología y modo de administración:

Se debe aplicar una pequeña cantidad suavemente en el área afectada dos o tres veces al día hasta que se produzca una mejoría.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

Puede aumentar la proporción de PBI en los pacientes con función tiroidea normal, y también interfiere con las pruebas de la función tiroidea. Por esta razón, tales pruebas no podrán efectuarse hasta pasado un mes desde la suspensión del tratamiento.

Uso en Embarazo y lactancia:

Embarazo y lactancia deberá consultar con su médico previamente.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No se conocen.

Sobredosis:

El uso sobre zonas extensas o erosionadas de la piel puede ocasionar, en el plazo de una semana, un aumento de los valores de PBI y síntomas similares a los de tirotoxicosis.

Los valores de PBI también se elevan cuando zonas de la piel relativamente pequeñas son tratadas durante más de una semana. En tales casos se retirará inmediatamente el medicamento.

Propiedades farmacodinámicas:

Código ATC: D08H30

Grupo farmacoterapéutico: D: Dermatológicos, D08: Antisépticos y desinfectantes, D08A: Antisépticos y desinfectantes, D08AH: Derivados de las quinolinas

Es un antibacteriano y antifúngico tópico de amplio espectro, cuyo mecanismo de acción no se ha aclarado.

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

Se absorbe a través de la piel tanto enferma como sana. Si el preparado se administra a dosis terapéuticas, la sustancia activa no puede detectarse en el plasma mediante los métodos analíticos convencionales (límite de detección: 0.02 g/ml). La cinética del clioquinol tras la aplicación tópica sólo puede determinarse en base a la excreción renal, que sirve para indicar la cantidad mínima absorbida de sustancia activa. En la orina sólo aparecen trazas de clioquinol inalterado

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No presenta.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 10 de julio de 2025.