

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	SAL ANDREWS LIMON
Forma farmacéutica:	Polvo efervescente
Fortaleza:	
Presentación:	Estuche por 12 sobres PVC/AL con 5 g cada uno. Estuche por 50 sobres PVC/AL con 5 g cada uno.
Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:	LIDO INTERNACIONAL S.A., Ciudad de Colón, República de Panamá.
Fabricante (es) del producto, ciudad (es), país (es):	GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A., Buenos Aires, Argentina. Producto terminado.
Número de Registro Sanitario:	154-25D3
Fecha de Inscripción:	13 de agosto de 2025
Composición:	
Cada sobre (5 g) contiene:	
Bicarbonato de sodio	2,310 g
Carbonato de sodio	0,5 g
Ácido cítrico	2,13 g
Plazo de validez:	24 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C.

Indicaciones terapéuticas:

Para el alivio sintomático de la acidez, indigestión, y el malestar estomacal asociado a éstos síntomas.

Contraindicaciones:

Enfermedades cardíacas, renales o hepáticas crónicas.

Hipertensión arterial.

Hipersensibilidad al bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, ácido cítrico o algún otro componente de la formulación o si está sometido a una dieta baja en sal.

Precauciones:

No usar cuando hay dolor abdominal, vómitos y otros síntomas de apendicitis o si presenta sangrado rectal.

No exceder la dosis diaria ni tomar por más de dos semanas, excepto por recomendación médica.

No tomar conjuntamente con productos lácteos.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Si está embarazada o en período de lactancia consulte a su médico antes de su uso.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

No usar si el sobre está roto.

Este medicamento reduce la acidez del estómago y puede interferir con la manera en que otros medicamentos son absorbidos por lo tanto se debe tomar los otros medicamentos a una hora diferente del día.

Cada sobre contiene 0,85 g de sodio. Consulte a su médico: Si los síntomas persisten por más de 3 días o empeoran.

Efectos indeseables:

A la dosis recomendada ninguno

Posología y modo de administración:

Disuelva un sobre en un vaso de agua. Tome cuando ocurran los síntomas. Una segunda dosis se puede tomar después de 2-3 horas.

Dosis máxima: 2 sobres en 24 horas. No use por más de 14 días.

No exceda la dosis de 2 sobres en 24 horas. No exceda la dosis recomendada, ni lo utilice por más de dos semanas excepto por recomendación médica.

Sal Andrews debe ser disuelto preferiblemente en agua a temperatura

Interacciones con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No administrar junto a anticolinérgicos, quinolonas, efedrina, litio, salicilatos y tetraciclinas.

Uso en embarazo y lactancia:

Si está embarazada o en período de lactancia consulte a su médico antes de su uso.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No procede

Sobredosis:

Acuda al médico inmediatamente

Propiedades farmacodinámicas:

Código ATC: A02AH

Grupo farmacoterapéutico: A: Tracto alimentario y metabolismo, A02: Agentes para Antiácidos, A02A: Antiácidos, A02AH: Antiácidos con bicarbonato de sodio

Antiácido absorbible de acción rápida. El bicarbonato excedente de la neutralización de ácido se absorbe y se elimina por orina, actuando también como alcalinizante sistémico y urinario. Produce efecto rebote.

Propiedades farmacocinéticas (absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

No se reporta

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No procede

Fecha de aprobación / revisión del texto: 13 de agosto de 2025.