

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	SAL ANDREWS CLASICA
Forma farmacéutica:	Polvo efervescente
Fortaleza:	
Presentación:	Estuche por 12 sobres PVC/AL con 5 g cada uno. Estuche por 50 sobres PVC/AL con 5 g cada uno.
Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:	LIDO INTERNACIONAL S.A., Ciudad de Colón, República de Panamá.
Fabricante (es) del producto, ciudad (es), país (es):	GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A., Buenos Aires, Argentina. Producto terminado.
Número de Registro Sanitario:	155-25D3
Fecha de Inscripción:	13 de agosto de 2025
Composición:	
Cada sobre (5 g) contiene:	
Bicarbonato de sodio	2,18 g
Sulfato de magnesio desecado	0,8825 g
Plazo de validez:	24 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C.

Indicaciones terapéuticas:

Alivio rápido del malestar estomacal, acidez, sensación de llenura, indigestión y otras molestias por excesos al comer o beber.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.
Niños menores de 12 años.
Pacientes con insuficiencia hepática o renal o con sangrado rectal.

Precauciones:

No usar cuando hay dolor abdominal, vómitos y otros síntomas de apendicitis. No exceder la dosis diaria ni tomar por más de dos semanas, excepto por recomendación médica. Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Si está embarazada o en período de lactancia consulte a su médico antes de su uso.
Hipertensión o alguna enfermedad cardíaca

Advertencias especiales y precauciones de uso:

No tomar conjuntamente con productos lácteos.
No usar si el sobre está roto.

Cada sobre contiene 0,44 g de sodio por lo que deben tener precaución los pacientes que están sometidos a una dieta pobre en sal.

Efectos indeseables:

A la dosis recomendada ninguno.

Posología y modo de administración:

Para uso en adultos y niños a partir de 12 años.

Como antiácido: Disuelva un sobre en medio vaso de agua.

Repita si es necesario.

Como digestivo y para restaurar la regularidad intestinal: Disuelva dos sobres en medio vaso de agua antes de acostarse o antes del desayuno.

No exceda la dosis máxima de cuatro sobres en 24 horas.

Puede ser tomada mientras esté efervescente o dejándolo reposar según el gusto.

Interacciones con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No administrar junto a anticolinérgicos, quinolonas, efedrina, litio, salicilatos y tetraciclinas.

Uso en embarazo y lactancia:

Si está embarazada o en período de lactancia consulte a su médico antes de su uso.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No procede

Sobredosis:

Acuda al médico inmediatamente.

Propiedades farmacodinámicas:

Código ATC: A02AH

Grupo farmacoterapéutico: A: Tracto alimentario y metabolismo, A02: Agentes para Antiácidos, A02A: Antiácidos, A02AH: Antiácidos con bicarbonato de sodio

Antiácido absorbible de acción rápida. El bicarbonato excedente de la neutralización de ácido se absorbe y se elimina por orina, actuando también como alcalinizante sistémico y urinario. Produce efecto rebote

Propiedades farmacocinéticas (absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

No se reporta.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No procede.

Fecha de aprobación / revisión del texto: 13 de agosto de 2025.