



## RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO HOMEOPÁTICO

<b>Nombre del producto:</b>	PREVENGHO® -VIR
<b>Origen del material de partida:</b>	Vegetal, animal y biológico.
<b>Forma farmacéutica:</b>	Gotas sublinguales
<b>Grado de dilución o potenciación:</b>	30 CH – 200 CK
<b>Presentación:</b>	Estuche por un frasco gotero de PEBD blanco con 5 ó 10 mL. Estuche por 12 frascos goteros de PEBD blanco con 5 ó 10 mL.
<b>Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:</b>	EMPRESA LABORATORIO AICA, La Habana, Cuba.
<b>Fabricante (es) del producto, ciudad (es), país (es):</b>	EMPRESA LABORATORIO AICA, Cuba. UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE (UEB) Laboratorios "Julio Trigo".
<b>Número de Registro Sanitario:</b>	H-20-012-V03
<b>Fecha de Inscripción:</b>	20 de marzo de 2020
<b>Material de partida:</b>	Tintura madre homeopática a partir de las Reglas de preparación Hahnemannianas 1/100 de <i>Anas barbariae</i> , <i>Arsenicum album</i> , <i>Baptisia tinctoria</i> , <i>Byonia alba</i> , <i>Eupatorium perfoliatum</i> , <i>Gelsemium</i> , <i>Pneumococinum</i> , <i>Influenzinum</i> , <i>Bacilinum</i> , <i>Crotalus horridus</i> y Coadyuvantes florales del sistema Bach.
<b>Plazo de validez:</b>	24 meses
<b>Condiciones de almacenamiento:</b>	Almacenar por debajo de 30 °C. No refrigerar. Protéjase de la luz.

### Usos recomendados:

Este Medicamento Homeopático se recomienda para la prevención y tratamiento de la influenza, enfermedades gripales, dengue e infecciones virales emergentes.  
Se recomienda su uso en condiciones de riesgo epidemiológico.

### Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes.

### Precauciones:

El uso de este producto no excluye, sustituye o limita la aplicación de otros tratamientos. Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que, en niños menores de 10 años, embarazo, lactancia, geriatría y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluir 5 gotas en ¼ vaso de agua.

**Advertencias especiales y precauciones de uso.**

No manipular o administrar este producto en presencia de olores fuertes (perfume, tabaco, ambientadores, mentol, desinfectantes, etc.).

No administrar junto con comidas o bebidas.

Se recomienda, no fumar, beber, comer o lavarse los dientes 20 minutos antes y después de la administración.

Mantener alejado de equipos electrónicos que generen ondas electromagnéticas fuertes (Televisores, microondas, computadoras, celulares, radios, teléfonos inalámbricos, refrigeradores, etc.).

En caso de aparición de síntomas severos asociados a los usos recomendados u otros signos no relacionados, se debe acudir al médico.

**Efectos indeseables:**

No se han descrito.

**Posología y modo de Administración.**

Para la prevención: 5 gotas debajo de la lengua 1 vez al día por 3 días consecutivos.

Tomar otra dosis única de 5 gotas debajo de la lengua una semana después (10<sup>mo</sup> día).

Es recomendable completar el número de dosis del esquema preventivo.

Para el tratamiento: 5 gotas debajo de la lengua 4 veces al día por 2 días. Continuar con gotas debajo de la lengua 2 veces al día por 2 días. A partir del 5<sup>o</sup> día de tratamiento continuar con 5 gotas debajo de la lengua 1 vez al día por 5 días.

**Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacciones:**

No se han descrito.

**Uso en Embarazo y lactancia.**

Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que, en niños menores de 10 años, Embarazo, Lactancia, Geriatria y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluirlo en ¼ vaso de agua.

**Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias.**

No se han descrito.

**Sobredosis:**

Medidas generales.

**Otras propiedades atribuidas o demostradas:**

No se presentan.

**Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:**

Antes de administrar cada dosis se sugiere golpear al menos 10 veces el frasco contra la palma de la mano. Se recomienda la administración sublingual con la boca completamente limpia y libre de olores fuertes y cualquier sabor. Por lo que no se debe comer, beber, cepillarse los dientes ni fumar 20 minutos antes o después de la administración del medicamento. En caso de administrar el producto diluido en agua potable (1/4 vaso), este se debe retener en la boca durante 5 segundos garantizando el contacto sublingual. Se recomienda además evitar el contacto del cuentagotas, el interior de la tapa o el medicamento con las manos o labios.

**Fecha de aprobación/revisión del texto:** 31 de agosto de 2025.