



## RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

<b>Nombre del producto:</b>	TIOMERSAL 0,1 %
<b>Forma farmacéutica:</b>	Tintura
<b>Fortaleza:</b>	0,1 %
<b>Presentación:</b>	Estuche por 1 frasco de vidrio ámbar con 30 ó 240 mL. Estuche por 1 frasco de PET ámbar con 30 ó 240 mL.
<b>Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:</b>	EMPRESA LABORATORIO FARMACÉUTICO LÍQUIDOS ORALES, Medilip, Cuba.
<b>Fabricante (s) del producto, ciudad (es), país (es):</b>	EMPRESA LABORATORIO FARMACÉUTICO LÍQUIDOS ORALES, Medilip, Cuba. Producto terminado.
<b>Número de Registro Sanitario:</b>	M-14-102-D08
<b>Fecha de Inscripción:</b>	16 de mayo de 2014
<b>Composición:</b>	Cada 100 mL contiene:  Tiomersal 100,0 mg Etanol 50,0 mL
<b>Plazo de validez:</b>	36 meses (Frasco de vidrio ámbar) 24 meses (Frasco de PET)
<b>Condiciones de almacenamiento:</b>	Almacenar por debajo de 30 °C. Protéjase de la luz.

### Indicaciones terapéuticas:

Desinfección preoperatoria de la piel.

Antiséptico para heridas abiertas, en heridas infectadas

### Contraindicaciones:

Hipersensibilidad conocida a los radicales tio o mercúricos, como los que contiene el tiomersal.

### Precauciones:

No deberá emplearse cuando el aluminio pueda ponerse en contacto con la piel.

El uso frecuente o prolongado en extensas áreas de la piel puede causar serio envenenamiento con mercurio.

### Advertencias especiales y precauciones de uso:

Sólo para uso externo.

Si hay enrojecimiento, inflamación, dolor, infección, rash o irritación persistente o en incremento, descontinuar su uso y consultar con el médico.

Contiene Tiomersal, puede causar dermatitis de contacto y decoloración.

Contiene etanol, debe evitarse su uso frecuente sobre la piel.

**Efectos indeseables:**

Frecuentes: erupciones eritematosas, vesiculares y papulares sobre el área de aplicación de la piel (indican hipersensibilidad).

Se ha reportado como ototóxico.

Conjuntivitis alérgica.

**Posología y modo de administración:**

Se aplica y se instila diariamente en el área afectada, 2 ó 3 veces/día.

Permitir que se seque completamente la solución antes de colocar el vendaje.

Debe aplicarse por todo el campo operatorio y más allá de sus límites.

Después de suturar las heridas del área cutánea pueden hacerse pinceladas.

**Interacciones con otros productos medicinales y otras formas de interacción:**

Incompatible con permanganato, ácidos fuertes, sales de metales pesados, iodo, ya que inhiben su absorción.

**Uso en embarazo y lactancia:**

Usar con precaución.

**Efectos sobre la conducción de vehículos / maquinarias:**

No se ha establecido.

**Sobredosis:**

Medidas generales

**Propiedades farmacodinámicas:**

ATC. D08AK6

Grupo Farmacoterapéutico: D- Dermatológicos, D08-Antisépticos y desinfectantes. C08A-Antisépticos y desinfectantes. D08AK-Productos mercuriales.

El tiomersal es un antiséptico mercurial con propiedades bacteriostáticas y fungistáticas. Es usado usualmente de forma tópica en concentraciones de 0.1%.

En concentraciones de 0.01 a 0.02% es usado preservante biológico y de productos farmacéuticos.

**Propiedades farmacocinéticas (absorción, distribución, biotransformación, eliminación):**

Comienzo y duración del efecto: El comienzo de la actividad es inmediato.

**Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:**

No procede.

**Fecha de aprobación / revisión del texto:** 31 de octubre de 2025