



RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO HOMEOPÁTICO

Nombre del producto: ALIVIHO® POSTVIR

Origen del material de partida: Vegetal y químicamente definido

Forma farmacéutica: Gotas sublinguales

Grado de dilución o potenciación: 12-30 CH

Presentación: Estuche por 1 frasco gotero de PEBD blanco con 5 mL

Estuche por 12 frascos goteros de PEBD blanco con 5 mL cada uno.

Titular del Registro Sanitario, ciudad, país: Empresa Laboratorio AICA, La Habana, Cuba.

Fabricante (es) del producto, ciudad (es), país (es): Empresa Laboratorios AICA, La Habana, Cuba. UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE (UEB) "Laboratorios Julio Trigo".

Número de Registro Sanitario: M-25-047-V03

Fecha de Inscripción: 24 de diciembre de 2025.

Material de partida:

Tintura madre homeopática a partir de las Reglas de preparación Hahnemannianas 1/100; *Rhododendrum 12 CH*, *Kalmia latifolia 12 CH*, *Carbo vegetabilis 30 CH*, *Rhus toxicodendron 12 CH*, *Hypericum perforatum 30 CH*, *Baryta carbonica 12 CH*, *Ledum palustre 30 CH*, *Ruta graveolens 30 CH*, *Kali phosphoricum 30 CH*, *Arsenicum album 30 CH*

Plazo de validez: 12 meses

Condiciones de almacenamiento: Almacenar por debajo de 30 °C. No refrigerar. Protéjase de la luz. Manténgase el frasco dentro del estuche y alejado de los equipos electrodomésticos.

Usos recomendados:

Uso es posterior a la etapa aguda del virus.

Medicamento homeopático recomendado como tratamiento auxiliar en los síntomas persistentes o prolongados de las enfermedades producidas por los arbovirus, enfermedades virales agudas con síntomas clínicos compatibles con Chikungunya, Zika, Dengue, Oropouche.

Fiebre intermitente / febrículas / dolor articular sordo / rigidez articular / dolores en hombros, rodillas, manos y pies / debilidad / fatiga / náuseas / hinchazón articular / inapetente / diarreas.

La acción clínica de cada componente para el uso recomendado es la siguiente:

Componente	Coadyuva al alivio de:
<i>Rhododendrom</i>	Síntomas reumáticos muy marcados, articulaciones hinchadas. Dolores desgarrantes en todas las articulaciones afectadas, peor por el reposo. Dolor en hombros, brazos y muñecas.
<i>Kalmia latifolia</i>	Dolores articulares y neurálgicos erráticos. Dolores de cadera, rodilla y pie que abarcan gran parte de la articulación, debilidad intensa, entumecimiento, agrava por el movimiento.
<i>Hypericum perforatum</i>	Dolores agudos e intolerantes, dolores como flechazos en hombros. Presión en el brazo a lo largo del nervio cubital. Calambres en pantorrillas. Dolores en los dedos, en especial en las puntas, hormigueos en manos y pies. Dolores lancinantes en extremidades superiores e inferiores. Neuritis. Dolor ardoroso. Ansiedad. Nauseas.
<i>Arsenicum album</i>	Debilidad y agotamiento crónico después del menor esfuerzo, prurito, fiebre elevada intermitente, temblores, hinchazón de los pies, neuritis periférica.
<i>Carbo vegetabilis</i>	Extremidades pesadas, rígidas, falta de energía muscular, dolor ardoroso en huesos y extremidades. Fiebres con escalofríos. Muy debilitado
<i>Rhus toxicodendron</i>	Cansancio generalizado con rigidez, deseos de cambiar constantemente de posición con el fin de mejorar los dolores, diarreas acuosas indoloras, rigidez dolorosa de los miembros que aumenta en los primeros movimientos y mejora con la continuidad d ellos mismos. Dolores desgarradores de los tendones y ligamentos periarticulares. Fiebres adinámicas escalofríos y temblores.
<i>Baryta carbonica</i>	Ganglios inflamados, sensibilidad dolorosa de los pies
<i>Ledum palustre</i>	Dolores súbitos, punzantes en el pie, extremidades y pequeñas articulaciones. Latidos en el hombro derecho, tobillos hinchados, dolorosos. Sensibilidad dolorosa de la planta de los pies
<i>Ruta graveolens</i>	Fatiga extrema con sensación de magullamiento, agrava por el frío, la humedad, el tacto, al sentarse y agacharse. Dolores en las caderas q se extiende a las piernas.
<i>Kali phosphoricum</i>	Agotamiento nervioso después de una enfermedad prolongada. Fatiga, rigidez que empeora después del reposo. Prurito

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al medicamento o a alguno de sus componentes.

Precauciones:

El uso de este producto no excluye, sustituye o limita la aplicación de otros tratamientos o medidas higiénicas sanitarias para el control de la enfermedad.

Este producto contiene etanol al 30%.

Embarazo, lactancia, geriatría y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluir la dosis (5 gotas) en ¼ vaso de agua.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

No refrigerar.

Mantenga el frasco dentro del estuche, alejado de equipos generadores de campos electromagnéticos (equipos electrodomésticos: televisores, microondas, computadoras, celulares, radios, teléfonos inalámbricos, refrigeradores, etc.), de perfumes y olores fuertes.

No administrar junto con comidas o bebidas.

Se recomienda, no fumar, beber, comer o lavarse los dientes 20 minutos antes y después de la administración.

Durante el uso de este producto en personas sensibles es posible una ligera agravación temporal de algunos síntomas relacionados con la enfermedad que es seguida de una rápida mejoría.

En caso de persistencia de estos síntomas por más de dos días o aparición de síntomas severos u otros signos no relacionados, se debe acudir al médico.

Efectos indeseables:

No se han descrito.

Posología y modo de administración:

Se recomienda la administración de (5 gotas) 3 veces al día hasta la recuperación completa de los síntomas o hasta 3 meses máximos.

Si no hay mejoría en este plazo consulte a su médico. Siempre respetando el sueño.

Interacciones con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No se han descrito

Uso en Embarazo y lactancia.

Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que, en niños menores de 10 años, embarazo, lactancia, geriatría y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluirlo en ¼ vaso de agua.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias.

No se han descrito.

Sobredosis:

No se han descrito.

Otras propiedades atribuidas o demostradas.

No se han reportado hasta la fecha.

Instrucciones de uso y manipulación del producto.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

Antes de administrar cada dosis se sugiere golpear al menos 10 veces el frasco contra la palma de la mano. Se recomienda la administración sublingual con boca completamente limpia y libre de olores fuertes y cualquier sabor. Por lo que no se debe comer, beber, cepillarse los dientes ni fumar 20 minutos antes o después de la administración del medicamento. En caso de administrar el producto diluido en agua potable (1/4 vaso), este se debe retener en la boca durante 5 segundos

garantizando el contacto sublingual. Se recomienda además evitar el contacto del cuentagotas, el interior de la tapa o el medicamento con las manos o labios.

Fecha de aprobación/revisión del texto: 24 de diciembre de 2025.