



RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO HOMEOPÁTICO

Nombre del producto: TRATHO® ARBOVIR

Origen del material de partida: Vegetal y animal.

Forma farmacéutica: Gotas sublinguales

Grado de dilución o potenciación: 6-15 CH

Presentación: Estuche por 1 frasco gotero de PEBD blanco con 5 mL.

Estuche por 12 frascos goteros de PEBD blancos con 5 mL cada uno.

Titular del Registro Sanitario, ciudad, país: EMPRESA LABORATORIOS AICA, La Habana, Cuba.

Fabricante (es) del producto, ciudad (es), país (es): EMPRESA LABORATORIOS AICA, La Habana, Cuba. UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE (UEB) "LABORATORIOS JULIO TRIGO".

Número de Registro Sanitario: H-25-048-V03

Fecha de Inscripción: 24 de diciembre de 2025

Material de partida:

Tintura madre homeopática a partir de las Reglas de preparación Hahnemannianas 1/100; *Apis mellifica* 12 CH, *Gelsemium sempervirens* 15 CH, *Atropa belladonna* 12 CH, *Eupatorium perforatum* 9 CH, *Bryonia alba* 12CH, *Ledum palustre* 9 CH, *Sulphur* 6 CH, *Carbo vegetabilis* 12 CH, *Arnica montana* 15 CH

Plazo de validez: 12 meses

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar por debajo de 30 °C. No refrigerar. Protégase de la luz.

Manténgase el frasco dentro del estuche y alejado de los equipos electrodomésticos

Usos recomendados:

Medicamento homeopático recomendado como tratamiento complementario en enfermedades virales agudas con síntomas clínicos compatibles con Chikungunya, Zika, Dengue, Oropouche. Síntomas: Fiebre / Dolor en pequeñas y grandes articulaciones / Postración / Debilidad física / Rash / Vómitos / Diarreas / Temblores / Anorexia / Frialidad corporal y escalofríos/ Rigidez articular.

La acción clínica de cada componente para el uso recomendado es la siguiente:

	Coadyuva al tratamiento de:
--	------------------------------------

<i>Apis mellifica</i>	Articulaciones hinchadas y sensibles al tacto. Dolor como piquetes, punzante, dolor y sensibilidad al tacto, rodillas hinchadas. Somnolencias. Escalofríos en las fiebres, sensación de rigidez, diarreas acuosas, amarillas.
<i>Sulphur</i>	Dolor reumático en hombro, pesadez. Rigidez de rodillas y tobillos, no puede caminar erecto, hombros caídos. Prurito, ardor, peor rascándose y levantándose. Empeora en reposo, parado. Piel seca y mucha sed. Fiebre.
<i>Gelsemium sempervirens</i>	Parálisis motora, postración, temblores, fiebre intensa, mareo, somnolencia, diarreas, debilidad de todas las extremidades, fatiga por el menor ejercicio. Dolores bruscos, lancinantes q hacen sobresaltar al enfermo.
<i>Atropa belladonna</i>	Dolores súbitos a lo largo de las extremidades, articulaciones rojas, hinchadas, marcha tambaleante, dolores tipo reumáticos, cojera involuntaria, espasmos. Fiebres altas, ganglios hinchados, erupciones como escarlatinas, vasculitis.
<i>Eupatorium perfoliatum</i>	Dolores de huesos severos, con dolor muscular. Brazos y muñecas adoloridas. Fiebre con escalofrío y sed intensa sensación de quebrantamiento y Lasitud generalizada. Fiebres intermitentes. Náuseas y vómitos. Diarreas acuosas.
<i>Bryonia alba</i>	Inflación aguda, dolores punzantes, desgarrantes. Agrava al movimiento. Mejoría al reposo. Sabor amargo de la boca, rodillas rígidas, hinchazón caliente de los pies, articulaciones rojas, sequedad de boca. Escalofrío con frio externo, sudoración profusa.
<i>Ledum palustre</i>	Dolores súbitos, punzantes en el pie, extremidades y pequeñas articulaciones. Latidos en el hombro derecho, tobillos hinchados, dolorosos. Sensibilidad dolorosa de la planta de los pies.
<i>Carbo vegetabilis</i>	Extremidades pesadas, rígidas, falta de energía muscular, dolor ardoroso en huesos y extremidades. Fiebres con escalofríos. Muy debilitado.
<i>Arnica montana</i>	Dolor en la espalda y extremidades, no puede caminar erecto. Reumatismo, pero al tacto, sensación de cansancio y magulladura. Debilidad intensa que llega a la postración.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al medicamento o a alguno de sus componentes.

Precauciones:

El uso de este producto no excluye, sustituye o limita la aplicación de otros tratamientos o medidas higiénicas sanitarias para el control de la enfermedad. Este producto contiene etanol al 30%. Embarazo, lactancia, geriatría y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluir la dosis (5 gotas) en ¼ vaso de agua.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

No refrigerar. Mantenga el frasco dentro del estuche, alejado de equipos generadores de campos electromagnéticos (equipos electrodomésticos: televisores, microondas, computadoras, celulares, radios, teléfonos inalámbricos, refrigeradores, etc.), de perfumes y olores fuertes.

No administrar junto con comidas o bebidas. Se recomienda, no fumar, beber, comer o lavarse los dientes 20 minutos antes y después de la administración.

Durante el uso de este producto en personas sensibles es posible una ligera agravación temporal de algunos síntomas relacionados con la enfermedad que es seguida de una rápida mejoría. En caso de persistencia de estos síntomas por más de dos días o aparición de síntomas severos u otros signos no relacionados, se debe acudir al médico.

Efectos indeseables:

No se han descrito.

Posología y modo de administración:

Se recomienda la administración de (5 gotas) de 3 a 5 veces al día hasta la recuperación completa de los síntomas.

En caso de síntomas muy marcados como la fiebre o el dolor articular se puede tomar 5 gotas cada 1 hora hasta el alivio de los síntomas y luego continuar hasta completar un máximo de 5 veces.

No pasar de 21 días. Siempre respetando el sueño.

Interacciones con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No se han descrito

Uso en Embarazo y lactancia:

Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que en niños menores de 10 años, embarazo, lactancia, geriatría y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluirlo en ¼ vaso de agua.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No se han descrito.

Sobredosis:

No se han descrito.

Otras propiedades atribuidas o demostradas:

No se han reportado hasta la fecha.

Instrucciones de uso y manipulación del producto:

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

Antes de administrar cada dosis se sugiere golpear al menos 10 veces el frasco contra la palma de la mano. Se recomienda la administración sublingual con boca completamente limpia y libre de olores fuertes y cualquier sabor. Por lo que no se debe comer, beber, cepillarse los dientes ni fumar 20 minutos antes o después de la administración del medicamento. En caso de administrar el producto diluido en agua potable (1/4 vaso), este se debe retener en la boca durante 5 segundos garantizando el contacto sublingual. Se recomienda además evitar el contacto del cuentagotas, el interior de la tapa o el medicamento con las manos o labios.

Fecha de aprobación/revisión del texto: 24 de diciembre de 2025.

