

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO HOMEOPÁTICO

Nombre del Producto:	ALIVIHO® - CEFALEA
Forma Farmacéutica:	Gotas sublinguales
Titular, ciudad, país:	EMPRESA LABORATORIOS AICA, La Habana, Cuba.
Fabricante, ciudad, país:	EMPRESA LABORATORIOS AICA, La Habana, Cuba. UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE (UEB) Laboratorios "Julio Trigo". Producto terminado.
No. de Registro:	H-20-062-V03
Fecha de Inscripción:	4 de agosto de 2020
Fecha de Vencimiento del Registro:	Agosto de 2030

Material de partida:

Tintura madre homeopática a partir de las Reglas de preparación Hahnemannianas 1/100 de: *Atropa belladonna* 30 CH, *Bryonia alba* 15 CH, *Cyclamen europaeum* 15 CH, *Gelsemium sempervirens* 15 CH, *Glonoinum* 12 CH, *Iris versicolor* 12 CH, *Natrum muriaticum* 9 CH, *Sanguinaria canadensis* 15 CH, *Spigelia anthelmia* 15 CH.

Potencia del producto terminado:	9 - 30 CH
Presentación:	Estuche por 1 frasco gotero de PEBD blanco con 5 ó 10 mL. Estuche por 12 frascos goteros de PEBD blanco con 5 ó 10 mL cada uno.
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C. No refrigerar. Protéjase de la luz.
Plazo de validez:	24 meses

Usos recomendados: Se recomienda como tratamiento analgésico auxiliar para el dolor agudo relacionado con crisis de cefalea o migrañas ocasionales.

La acción clínica de cada componente para el uso recomendado es la siguiente:

Componente	Coadyuva al alivio de:
Atropa belladonna	Dolores agudos, migraña
Bryonia alba	Dolor de aparición gradual, irritabilidad, fotofobia
Cyclamen europaeum	Migraña,
Gelsemium sempervirens	Dolor de cabeza y cuello, sensación de pesadez, hipersensibilidad al movimiento, debilidad
Glonoinum	Dolor pulsante, confusión

Iris versicolor	Neuralgia, irritabilidad, depresión
Natrum muriaticum	Dolores punzantes, sensibilidad a la luz y el ruido.
Sanguinaria canadensis	Dolores con náuseas y vómitos, sensibilidad a luz y ruido
Spigelia anthelmintica	Dolores de cabeza periódicos, sensación dolorosa al tacto.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes.

Precauciones:

El uso de este producto no excluye, sustituye o limita la aplicación de otros tratamientos. Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que, en niños menores de 10 años, embarazo, lactancia, geriatría y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluirlo en ¼ vaso de agua.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

No manipular o administrar este producto en presencia de olores fuertes (perfume, tabaco, ambientadores, mentol, desinfectantes, etc.).

No administrar junto con comidas o bebidas.

Se recomienda, no fumar, beber, comer o lavarse los dientes 20 minutos antes y después de la administración.

Mantener alejado de equipos electrónicos que generen ondas electromagnéticas fuertes (televisores, microondas, computadoras, celulares, radios, teléfonos inalámbricos, refrigeradores, etc).

En caso de aparición de síntomas severos asociados a los usos recomendados u otros signos no relacionados, se debe acudir al médico.

Efectos indeseables:

No se han reportado hasta la fecha.

Posología y modo de administración:

Se recomienda la administración de una dosis (5 gotas) 4 veces al día durante al menos 5 días.

En caso de agudización de los síntomas, puede administrarse una dosis (5 gotas) cada 1 h y luego, en la medida en que se alcance la mejoría, disminuir gradualmente la frecuencia hasta la posología recomendada de 4 dosis diarias.

Se recomienda no exceder los 21 días de tratamiento.

Durante el tratamiento deben respetarse los horarios de sueño.

Interacciones con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No se han reportado hasta la fecha.

Uso en embarazo y lactancia.

Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que, en niños menores de 10 años, embarazo, lactancia, geriatría y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluirlo en ¼ vaso de agua.

Efectos sobre la conducción de vehículos / maquinaria:

No se han reportado hasta la fecha.

Sobredosis:

Medidas generales

Otras propiedades atribuidas o demostradas.

No se han reportado hasta la fecha.

Instrucciones de uso y manipulación del producto.

Antes de administrar cada dosis se sugiere golpear al menos 10 veces el frasco contra la palma de la mano.

Se recomienda la administración sublingual con la boca completamente limpia y libre de olores fuertes y cualquier sabor. Por lo que no se debe comer, beber, cepillarse los dientes ni fumar 20 minutos antes o después de la administración del medicamento.

En caso de administrar el producto diluido en agua potable (1/4 vaso), este se debe retener en la boca durante 5 segundos garantizando el contacto sublingual.

Se recomienda además evitar el contacto del cuentagotas, el interior de la tapa o el medicamento con las manos o labios.

Se sugiere dispensar previamente cada dosis (5 gotas) en la tapa del frasco y luego administrar debajo de la lengua.

Fecha de aprobación/revisión del texto: 28 de febrero de 2026.

