

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO HOMEOPÁTICO

Nombre del producto: ALIVIHO[®] - MENSTRUAL

Forma farmacéutica: Gotas sublinguales

Titular, dirección país: EMPRESA LABORATORIOS AICA, La Habana, Cuba.

Fabricante, ciudad, país: EMPRESA LABORATORIOS AICA, La Habana, Cuba.
UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE (UEB) "Laboratorios Julio Trigo".
Producto terminado.

Número de Registro Sanitario: H-20-065-V03

Fecha de inscripción: 4 de agosto de 2020

Material de partida: Tintura madre homeopática a partir de las Reglas de preparación: Hahnemannianas 1/100 de: Bellis perennis 9 CH, Cimicifuga racemosa 15 CH, Citrus colocynthis 30 CH, Dioscorea villosa 30 CH, Kali carbonicum 30 CH, Magnesia phosphoricum 30 CH, Pulsatilla nigricans 12 CH, Sabina officinalis 15 CH, Senecio aureus 15 CH, Veratrum album 12 CH.

Potencia del producto terminado: 9 CH- 30 CH

Presentación: Estuche por 1 frasco gotero de PEBD blanco con 5 o 10 mL.
Estuche por 12 frascos goteros de PEBD blanco con 5 o 10 mL cada uno.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar por debajo de 30 °C. No refrigerar. Protéjase de la luz.

Plazo de validez: 24 meses

Usos recomendados:

Medicamento homeopático recomendado como tratamiento auxiliar de dolores agudos relacionados con el período menstrual.

Componentes de la formulación y su patogenesia que coadyuva al tratamiento indicado:

Componentes	Coadyuva al alivio de:
<i>Bellis perennis</i>	Dolor pélvico
<i>Cimicifuga racemosa</i>	Dismenorrea, dolor de ovarios y cefalea relacionados con la menstruación
<i>Citrullus colocynthis</i>	Dolor de ovarios, irritabilidad
<i>Dioscorea villosa</i>	Dolor menstrual, dismenorrea
<i>Kali carbonicum</i>	Irritabilidad, ansiedad, excitabilidad, leucorrea y metrorragia
<i>Magnesia phosphoricum</i>	Dolor menstrual
<i>Pulsatilla nigricans</i>	Tonifica sistema reproductivo femenino
<i>Juniperus sabina</i>	Hemorragias, ardor y prurito de genitales
<i>Senecio aureus</i>	Desajuste de ciclos menstruales, hemorragias
<i>Veratrum album</i>	Debilidad, colapso, alteraciones emocionales

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al medicamento o a alguno de sus componentes.

Precauciones:

El uso de este producto no excluye, sustituye o limita la aplicación de otros tratamientos. Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que, en caso de embarazo, lactancia, niños menores de 10 años y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluir la dosis (5 gotas) en ¼ vaso de agua potable.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

No manipular o administrar este producto en presencia de olores fuertes (perfume, tabaco, ambientadores, mentol, desinfectantes, etc.).

No administrar junto con comidas o bebidas.

Se recomienda, no fumar, beber, comer o lavarse los dientes 20 minutos antes y después de la administración.

Mantener alejado de equipos electrónicos que generen ondas electromagnéticas fuertes (Televisores, microondas, computadoras, celulares, radios, teléfonos inalámbricos, refrigeradores, etc.).

En caso de aparición de síntomas severos asociados a los usos recomendados u otros signos no relacionados, se debe acudir al médico.

Efectos indeseables:

No se han descrito hasta el momento.

Posología y modo de administración.

Se recomienda la administración de una dosis (5 gotas) 4 veces al día durante al menos 5 días.

En caso de agudización de los síntomas, puede administrarse una dosis (5 gotas) cada 1 h y luego, en la medida en que se alcance la mejoría, disminuir gradualmente la frecuencia hasta la posología recomendada de 4 dosis diarias.

Se recomienda no exceder los 21 días de tratamiento.

Durante el tratamiento deben respetarse los horarios de sueño.

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacciones:

No se han descrito hasta el momento.

Uso en Embarazo y lactancia.

Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que, en niños menores de 10 años, Embarazo, Lactancia, Geriatria y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluirlo en ¼ vaso de agua.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias.

No se han descrito hasta el momento.

Sobredosis: Medidas generales.

Otras propiedades atribuidas o demostradas:

No se presentan.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

Antes de administrar cada dosis se sugiere golpear al menos 10 veces el frasco contra la palma de la mano. Se recomienda la administración sublingual con boca completamente limpia y libre de olores fuertes y cualquier sabor. Por lo que no se debe comer, beber, cepillarse los dientes ni fumar 20 minutos antes o después de la administración del medicamento.

En caso de administrar el producto diluido en agua potable (1/4 vaso), este se debe retener en la boca durante 5 segundos garantizando el contacto sublingual. Se recomienda además evitar el contacto del cuentagotas, el interior de la tapa o el medicamento con las manos o labios.

Fecha de aprobación/revisión del texto: 28 de febrero del 2026.