



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO HOMEOPÁTICO

Nombre del Producto:	SCABIHOM ®
Forma Farmacéutica:	Gotas sublinguales
Titular, ciudad, país:	EMPRESA LABORATORIOS AICA, La Habana, Cuba.
Fabricante, ciudad, país:	EMPRESA LABORATORIOS AICA, La Habana, Cuba. UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE (UEB) Laboratorios "Julio Trigo". Producto terminado.
No. de Registro:	H-20-076-V03
Fecha de Inscripción:	13 de octubre de 2020
Fecha de Vencimiento del Registro:	Octubre de 2031
Fecha de Renovación de Registro:	26 de febrero de 2026
Material de partida:	Tintura madre homeopática a partir de las Reglas de preparación Hahnemannianas 1/100 de: Tintura madre homeopática a partir de las Reglas de preparación Hahnemannianas 1/100 de <i>Psorinum, Kali sulphuricum, Natrum muriaticum, Sepia, Tuberculinum bovinum, Arsenicum álbum, Sulphur, Causticum, Dulcamara</i> y Solución hidroalcohólica al 30% c.s.
Potencia del producto terminado:	30CH-200 CH
Presentación:	Estuche por 1 frasco gotero de PEBD blanco con 5 ó 10 mL. Estuche por 12 frascos goteros de PEBD blanco con 5 ó 10 mL cada uno.
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C. No refrigerar. Protéjase de la luz.
Plazo de validez:	24 meses
Usos recomendados:	Medicamento homeopático recomendado como tratamiento auxiliar en cuadro de escabiosis (sarna).
Contraindicaciones:	Hipersensibilidad al medicamento o a alguno de sus componentes.

Precauciones:

El uso de este producto no excluye, sustituye o limita la aplicación de otros tratamientos.

Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que, en niños menores de 10 años.

Embarazo, Lactancia

Geriatría y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluir la dosis (5 gotas) en $\frac{1}{4}$ vaso de agua potable.

Advertencias:

No refrigerar. Mantenga el frasco dentro del estuche, alejado de equipos generadores de campos electromagnéticos (equipos electrodomésticos: televisores, microondas, computadoras, celulares, radios, teléfonos inalámbricos, refrigeradores, etc.), de perfumes y olores fuertes.

Durante el uso de este producto en personas sensibles es posible una ligera agravación temporal de algunos síntomas relacionados con la enfermedad que es seguida de una rápida mejoría.

En caso de persistencia de estos síntomas por más de dos días o aparición de síntomas severos u otros signos no relacionados, se debe acudir al médico.

Efectos indeseables:

No se han descrito hasta el momento.

Posología y modo de Administración.**PREVENCIÓN:**

Para contribuir a la prevención de la enfermedad, aplicar una dosis (5 gotas) debajo de la lengua durante tres días seguidos. Posterior a esto, tomar dosis única de 5 gotas debajo de la lengua una vez por semana mientras permanezcan los riesgos epidemiológicos de infección.

TRATAMIENTO:

En el tratamiento de la enfermedad se recomienda la administración de una dosis (5 gotas) 4 veces al día durante 10 días, cesar por una semana y reanudar el tratamiento con una dosis (5 gotas) 4 veces al día durante 10 días. Al concluir el ciclo, continuar con dosis única de 5 gotas debajo de la lengua una vez por semana, mientras permanezcan los riesgos epidemiológicos de infección.

Durante el tratamiento deben respetarse los horarios de sueño.

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacciones:

No se han descrito hasta el momento.

Uso en Embarazo y lactancia.

Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que, en niños menores de 10 años, Embarazo, Lactancia, Geriatría y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluirlo en $\frac{1}{4}$ vaso de agua.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias.

No se han descrito hasta el momento.

Sobredosis: Medidas generales.

Otras propiedades atribuidas o demostradas:

No se presentan.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

Antes de administrar cada dosis se sugiere golpear al menos 10 veces el frasco contra la palma de la mano.

Se recomienda la administración sublingual con boca completamente limpia y libre de olores fuertes y cualquier sabor. Por lo que no se debe comer, beber, cepillarse los dientes ni fumar 20 minutos antes o después de la administración del medicamento.

En caso de administrar el producto diluido en agua potable (1/4 vaso), este se debe retener en la boca durante 5 segundos garantizando el contacto sublingual.

Se recomienda además evitar el contacto del cuentagotas, el interior de la tapa o el medicamento con las manos o labios.

Fecha de aprobación/revisión del texto: 28 de febrero de 2026