

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	ACICLOVIR 3 %
Forma farmacéutica:	Ungüento oftálmico
Fortaleza:	3%
Presentación:	Estuche por 1 tubo de AL con 5 g.
Titular del Registro Sanitario, ciudad, país:	LINDMED TRADE S.L., Madrid, España.
Fabricante (es) del producto, ciudad (es), país (es):	SUNWAYS (INDIA) PVT., LTD., Gujarat, India. Producto terminado.
Número de Registro Sanitario:	026-26D2
Fecha de Inscripción:	10 de junio 2026
Composición:	
Cada 100 g contiene:	
Aciclovir	3,0 g
Plazo de validez:	24 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C.
Indicaciones terapéuticas:	
Queratitis por herpes simple	
Contraindicaciones:	
Hipersensibilidad al aciclovir o al ganciclovir.	
Precauciones:	
Embarazo.	
Lactancia.	
Advertencias especiales y precauciones de uso:	
No se encuentran reportadas en su uso tópico.	
Efectos indeseables:	
Irritación pasajera, adherencia del medicamento a las pestañas.	
Puede producir hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.	
Posología y modo de administración:	
Aplicar una pequeña cantidad en el saco conjuntival cada 4 horas.	

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No procede

Uso en Embarazo y lactancia:

Estudios en animales del laboratorio en los que se administró Aciclovir vía sistémica a concentraciones superiores a las indicadas en el humano no mostraron efectos adversos, sin embargo, no se tienen estudios bien controlados en mujeres embarazadas por lo que su uso en esta condición queda a juicio del médico; es posible que la droga pase a la leche materna.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No procede

Sobredosis:

La sobredosificación puede favorecer la aparición de las reacciones secundarias.

Propiedades Farmacodinámicas:

Código ATC: S01AD03

Grupo farmacoterapéutico: S: Órganos de los sentidos, SO1: Oftalmológicos, S01A: Antiinfecciosos, S01AD: Antivirales.

El aciclovir es un agente antiviral contra el virus del herpes simple, el cual lo convierte a aciclovir monofosfato - un nucleótido - mediante la (HSV) - timidina quinasa, a difosfato mediante la guanilato quinasa celular y a trifosfato mediante varias enzimas celulares, este último interfiere con la polimerasa HSV - DNA, e inhibe la replicación del DNA, el trifosfato puede incorporarse a la cadena de DNA en formación por medio de la DNA-polimerasa dando como resultado la terminación de dicha cadena.

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

Puesto que el aciclovir es tomado y convertido selectivamente a la forma activa de trifosfato por las células infectadas por el HSV, es menos tóxico para las células normales; su absorción es mínima desde tejidos intactos y moderada desde tejidos enfermos, se distribuye ampliamente a los tejidos y fluidos corporales y su eliminación ocurre vía renal.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No procede.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 10 de junio de 2026