

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	Calamina® Antialérgica ANCALMO
Forma farmacéutica:	Suspensión tópica
Fortaleza:	-
Presentación:	Frasco de PEAD con 120 mL.
Titular del Registro Sanitario, país:	ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A. DE C.V., ANTIGUO CUSCATLÁN, EL SALVADOR.
Fabricante, país:	LABORATORIOS ANCALMO, ANTIGUO CUSCATLÁN, EL SALVADOR.
Número de Registro Sanitario:	045-15D3
Fecha de Inscripción:	11 de agosto de 2015.
Composición:	
Cada 100 mL contiene:	
Calamina	8,00 g
Óxido de zinc	8,00 g
Alcanfor	0,10 g
Clorhidrato de difenhidramina	1,00 g
Etanol 90°	1,00 mL
Aceite de castor	0,25 g
Propilenglicol	8,00 g
Plazo de validez:	36 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30° C. Protéjase de la luz.

Indicaciones terapéuticas:

Calamina Antialérgica de Ancalmo combina la acción antiséptica y suavizante de la Calamina con la acción antihistamínica y antiprurítica de los componentes de su fórmula.

Se recomienda para el alivio de molestias debido al salpullido, urticaria, quemaduras de sol y otras irritaciones de la piel de origen alérgico.

Contraindicaciones:

En caso de Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.

Precauciones:

La calamina es solo para uso externo.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

No ingerir.

No usar en los ojos, membranas mucosas (adentro de la boca, nariz, genitales o áreas cercanas al año) heridas abiertas o lesiones cutáneas severas.

Contiene Propilenglicol, puede causar irritación a la piel.

Agitar antes de usar.

Efectos indeseables:

No se ha informado acerca de ningún efecto secundario común o importante con este medicamento. Sin embargo, si nota cualquier efecto inusual, consulte a su médico.

Posología y método de administración:

Aplicar localmente 3-4 veces al día en el área afectada. La administración deberá ser t'poca exclusivamente.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

El empleo simultaneo con Alcohol t'pico incrementa la acción desecante de la calamina; el propilenglicol favorece la remoción de las escamas hiperqueratósicas.

Uso en Embarazo y lactancia:

No existen reportes que demuestren efecto toxico en mujeres embarazadas.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No afecta la capacidad de conducir o utilizar maquinaria.

Sobredosis:

No se han reportado casos de sobre dosificación; en caso de ingesta se debe inducir v'omito o en su caso lavado gástrico.

El contacto accidental con los ojos puede producir irritación.

Propiedades farmacodinámicas:

La actividad refrescante y antipruriginosa de la calamina es particularmente útil en áreas de erupción diseminadas que cursan con prurito; la calamina no se absorbe y se elimina con el lavado de la piel con agua por tanto no tiene efectos sistémicos. El alcanfor tiene una acción pruriginosa leve alterando la transmisión sensorial de los nervios cutáneos superficiales, el alcanfor tampoco pasa al torrente sistémico.

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

Ver Farmacodinamia.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No procede.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 11 de agosto de 2015.