

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	Zorritone®
Forma farmacéutica:	Caramelo
Fortaleza:	-
Presentación:	Estuche por 12 ó 16 barras de papel de AL con 9 caramelos en envoltura de celofán cada uno. Bolsa de AL con 15, 30 o 100 caramelos en envoltura de PE cada uno.
Titular del Registro Sanitario, país:	Establecimientos Ancalmo S.A. de C.V., El Salvador.
Fabricante, país:	Laboratorios Ancalmo, El Salvador.
Número de Registro Sanitario:	072-14D3
Fecha de Inscripción:	29 de octubre 2014.
Composición:	
Cada caramelo contiene:	
Bálsamo de El Salvador	7,2 mg
Gomenol	2,0 mg
Mentol	9,6 mg
Esencia de menta piperita	0,16 mg
Sacarosa 2400 mg	
Glucosa 1600 mg	
Plazo de validez:	36 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30°C. Protéjase de la luz y la humedad.

Indicaciones terapéuticas:

Alivian la garganta irritada, causada por los malestares comunes de la tos, resfriados y gripes, proporcionándole además un agradable y fresco aliento.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.

Contiene Sacarosa por lo que no debe ser administrado en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, mala absorción a la glucosa o galactosa o deficiencia de sacarosa isomaltasa.

Contiene glucosa, no administrar en pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa o mala absorción a la glucosa o galactosa.

Precauciones:

Pacientes con diabetes mellitus.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

Debido a la presencia de mentol en la fórmula se debe evitar el consumo excesivo, para evitar irritación gástrica.

Efectos indeseables:

No se han reportado efectos secundarios asociados al consumo de Caramelos Zorritone en las dosis sugeridas.

Posología y método de administración:

Adultos y niños mayores de 5 años: Disolver un caramelo en la boca. Repetir cada tres horas si fuera necesario.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No descritas.

Uso en Embarazo y lactancia:

No presentadas.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No procede.

Sobredosis:

La sobredosis accidental puede presentar síntomas como náuseas y dolor abdominal, se recomienda en caso de sobredosis lavar la boca con agua, administrar abundante agua, no inducir al vómito y buscar atención médica inmediatamente.

Propiedades farmacodinámicas:

No se ha reportado hasta la fecha.

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

No se ha reportado hasta la fecha.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No procede.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 29 de octubre 2014.