

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	TAB-A-VITE®
Forma farmacéutica:	Tableta revestida
Fortaleza:	-
Presentación:	Frasco de PEBD con 100 tabletas revestidas.
Titular del Registro Sanitario, país:	Medicaribe S.A., Cuba.
Fabricante, país:	MAJOR PHARMACEUTICALS, Estados Unidos de América.
Número de Registro Sanitario:	078-14D3
Fecha de Inscripción:	5 de noviembre 2014.
Composición:	
Cada tableta revestida contiene:	
Vitamina A (como acetato)	5000 IU
Vitamina C (como ácido ascórbico)	60,0 mg
Vitamina D-3 (como colecalciferol)	400 IU
Vitamina B-1 (como clorhidrato de tiamina)	1,5 mg
Vitamina B-2 (Riboflavina)	1,7 mg
Niacina (como vitamina B-3)	20,0 mg
Vitamina B-6 (como clorhidrato de piridoxina)	2,0 mg
Ácido fólico	400,0 mcg
Vitamina B12 (como cianocobalamina)	6,0 mcg
Plazo de validez:	36 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C. Protéjase de la humedad.

Indicaciones terapéuticas:

Las multivitamínicas son combinaciones de diferentes vitaminas que normalmente se encuentran en las comidas o en otras fuentes naturales. Las multivitamínicas se indican para entregar al cuerpo las vitaminas que se toman en su dieta. También se usan para el tratamiento de deficiencias vitamínicas (falta de vitaminas) causadas por enfermedad, embarazo, nutrición deficiente, problemas de la digestión y varias otras condiciones.

Contraindicaciones:

Informe a su médico si está embarazada, o pretende estarlo o si está lactando.

Contiene sacarosa, no administrar en pacientes con intolerancia a la fructosa o síndrome de malabsorción a la glucosa o galactosa o deficiencia de sacarasa isomaltasa

Precauciones:

Evite tomar más de una multivitamínicas al mismo tiempo.

Pacientes con diabetes mellitus.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

Tome multivitamínicas con un vaso de agua lleno, preferentemente con las comidas.

Efectos indeseables:

Varias vitaminas pueden causar efectos secundarios de gravedad o que pongan su vida en peligro si las tomas en cantidades grandes.

Los efectos secundarios que se presentan de mayor gravedad son: ronchas, dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, lengua y garganta. Los de menor gravedad incluyen: malestar estomacal, dolor de cabeza. Sabor desagradable en la boca.

Posología y método de administración:

Adultos una tableta al día en una de las comidas.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

Las multivitamínicas pueden influenciar en cómo funcionan en el organismo si se unen a algunos medicamentos. Dígale a su médico si está usando: diuréticos, cardiotónicos, antihipertensivos, tetrinoína, isotretinoína, trimetropina y sulfametoxazol, algún antiinflamatorio no esteroideo (AINES) y productos herbarios.

Uso en Embarazo y lactancia:

No tome multivitamínicas sin primero conocer si está embarazada o si pretende estarlo, ya que algunas vitaminas pueden hacerle daño al bebé neonato si se toman en grandes cantidades.

Las multivitamínicas pueden pasar a la leche materna por lo que pueden hacer daño al niño.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No procede.

Sobredosis:

Busque atención médica si considera que ha tomado una sobredosis. Los síntomas de la sobre dosis pueden incluir: dolor de estómago, vómitos, diarreas, estreñimiento, pérdida del apetito, pérdida del cabello, piel que se pela, cosquilleo alrededor de la boca, cambios en el periodo menstrual, pérdida de peso, dolor de cabeza agudo, dolor muscular o de las articulaciones, dolor de espalda intenso, sangre en la orina, piel pálida y sangrar o tener moretones con facilidad

Propiedades farmacodinámicas:

No se reporta en la literatura.

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

No se reporta en la literatura.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No procede.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 5 de noviembre 2014.