

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	Animal SHAPES®
Forma farmacéutica:	Tableta masticable
Fortaleza:	-
Presentación:	Frasco de PEBD con 100 tabletas masticables.
Titular del Registro Sanitario, país:	Medicaribe S.A., Cuba.
Fabricante, país:	MAJOR PHARMACEUTICALS, Estados Unidos de América.
Número de Registro Sanitario:	080-14D3
Fecha de Inscripción:	5 de noviembre 2014.
Composición:	
Cada tableta masticable contiene:	
Vitamina A (como acetato)	2500 UI
Vitamina C (como ácido ascórbico y ascorbato de sodio)	60,0 mg
Vitamina D-3 (colecalfiferol)	400 UI
Vitamina E (como acetato de dL-alfa tocoferilo)	15 UI
Vitamina B-1 (como tiamina monohidratada)	1,05 mg
Vitamina B-2 (riboflavina)	1,2 mg
Niacinamida (como vitamina B-3)	13,5 mg
Vitamina B-6 (como clorhidrato de piridoxina)	1,05 mg
Ácido fólico	300 mcg
Vitamina B-12 (como cianocobalamina)	4,5 mcg
Azúcar	
Tartrazina	
Plazo de validez:	36 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C. Protéjase de la humedad.

Indicaciones terapéuticas:

Las multivitamínicas son combinaciones de diferentes vitaminas que normalmente se encuentran en las comidas o en otras fuentes naturales. Las multivitamínicas se indican para entregar al cuerpo las vitaminas que se toman en su dieta. También se usan para el tratamiento de deficiencias vitamínicas (falta de vitaminas) causadas por enfermedad, embarazo, nutrición deficiente, problemas de la digestión y varias otras condiciones.

Contraindicaciones:

No tome multivitamínicas con leche o productos con base de leche, suplemento de calcio o antiácidos que contengan calcio. El calcio puede hacer más difícil para que su cuerpo pueda absorber algunos de los ingredientes de la multivitamínicas. Contiene sacarosa, no administrar en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, mala absorción a la glucosa o galactosa o deficiencia de sacarosa isomaltasa.

Precauciones:

Embarazo. Lactancia. Pacientes con diabetes mellitus.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

Evite tomar más de una multivitamínica al mismo tiempo. Tome multivitamínicas con un vaso de agua lleno, masticando las tabletas previamente.

No tome multivitamínicas sin primero conocer si está embarazada o si pretende estarlo, ya que algunas vitaminas pueden hacerle daño al bebé neonato si se toman en grandes cantidades. Las multivitamínicas pueden pasar a la leche materna por lo que pueden hacer daño al niño.

Efectos indeseables:

Varias vitaminas pueden causar efectos secundarios de gravedad o que pongan su vida en peligro si las tomas en cantidades grandes.

Los efectos secundarios que se presentan de mayor gravedad son: ronchas, dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, lengua y garganta. Los de menor gravedad incluyen: malestar estomacal, dolor de cabeza. Sabor desagradable en la boca.

Posología y método de administración:

Adultos y niños mayores de 2 años una tableta al día en una de las comidas.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

Las multivitamínicas pueden influenciar en cómo funcionan en el organismo si se unen a algunos medicamentos. Dígame a su médico si está usando: diuréticos, cardiotónicos, antihipertensivos, tetrínoina, isotretinoína, trimetropina y sulfametoxazol, algún antiinflamatorio no esteroideo (AINES) y productos herbarios.

Uso en Embarazo y lactancia:

No tome multivitamínicas sin primero conocer si está embarazada o si pretende estarlo, ya que algunas vitaminas pueden hacerle daño al bebé neonato si se toman en grandes cantidades. Las multivitamínicas pueden pasar a la leche materna por lo que pueden hacer daño al niño.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No procede

Sobredosis:

Busque atención médica si considera que ha tomado una sobredosis. Los síntomas de la sobre dosis pueden incluir: dolor de estómago, vómitos, diarreas, estreñimiento, pérdida del apetito, pérdida del cabello, piel que se pela, cosquilleo alrededor de la boca, cambios en el periodo menstrual, pérdida de peso, dolor de cabeza agudo, dolor muscular o de las articulaciones, dolor de espalda intenso, sangre en la orina, piel pálida y sangrar o tener moretones con facilidad.

Propiedades farmacodinámicas:

No se han reportado hasta la fecha

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

No se han reportado hasta la fecha

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No procede.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 5 de noviembre 2014.