

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|--|--|
| Nombre del producto: | UNGÜENTO ZEPOL®RESFRIOS |
| Forma farmacéutica: | Ungüento |
| Fortaleza: | - |
| Presentación: | Estuche por un frasco de PEAD con 30 g. |
| Titular del Registro Sanitario, país: | LABORATORIOS ZEPOL S.A., SAN JOSÉ, COSTA RICA. |
| Fabricante, país: | LABORATORIOS ZEPOL S.A., SAN JOSÉ, COSTA RICA. |
| Número de Registro Sanitario: | 1545 |
| Fecha de Inscripción: | 4 de mayo de 2000 |
| Composición: | |
| Cada 100 g contiene: | |
| Alcanfor | 6,55 g |
| Mentol | 6,55 g |
| Aceite de trementina | 2,05 g |
| Eucaliptol | 2,05 g |
| Aceite de tomillo | 0,82 g |
| Plazo de validez: | 48 meses |
| Condiciones de almacenamiento: | Almacenar por debajo de 30° C. |

Indicaciones terapéuticas:

El ungüento Zepol está indicado para el alivio de los síntomas del resfriado común, o sea contra los resfríos.

Alivio de los malestares de catarro y bronquitis.

También alivia los músculos adoloridos y dolores reumáticos asociados al resfrío.

Puede usarse en inhalaciones o fricciones.

Contraindicaciones:

No se use en niños menores de 2 años o en individuos con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

Precauciones:

Uso externo.

Evite el contacto con los ojos.

No se exponga a altas temperaturas.

Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

No aplica

Efectos indeseables:

No se le conocen, a no ser por aquellos originados por problemas de alergia a alguno de sus componentes.

Posología y método de administración:

Uso tópico.

Aplíquese y frótese en el área del pecho, cuello, y espalda dos o tres veces al día.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No se han reportado

Uso en Embarazo y lactancia:

El producto es de uso infantil.

Si una mujer embarazada lo utiliza debe tener cuidado de no aplicarlo cerca de las mamas, pues el olor a esencias naturales puede desestimular la alimentación del niño.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No se han descrito.

Sobredosis:

Puede provocar irritación en pieles sensibles.

Propiedades farmacodinámicas:

Los componentes del producto han sido caracterizados para el alivio del dolor el alcanfor mentol, eucaliptol.

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

No se han descrito ya que son varios principios activos

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No procede.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 31 de enero de 2016.