



## RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

<b>Nombre del producto:</b>	<b>VENATON®</b>
<b>Forma farmacéutica:</b>	Gotas
<b>Fortaleza:</b>	-
<b>Presentación:</b>	Estuche por un frasco de vidrio ámbar con 30 mL. Estuche por un frasco de PET ámbar con 30 mL.
<b>Titular del Registro Sanitario, país:</b>	EMPRESA LABORATORIO FARMACÉUTICO LÍQUIDOS ORALES, MEDILIP, BAYAMO, CUBA.
<b>Fabricante, país:</b>	EMPRESA LABORATORIO FARMACÉUTICO LÍQUIDOS ORALES, MEDILIP, BAYAMO, CUBA.
<b>Número de Registro Sanitario:</b>	N-14-214-C04
<b>Fecha de Inscripción:</b>	15 de octubre 2014.
<b>Composición:</b>	
Cada mL (20 gotas) contiene:	
Extracto fluido hidroalcohólico de Hamamelis virginiana 60 % (1:4) (equivalente a 2,65 mg de sustancias tánicas).	0,095 mL
Extracto fluido hidroalcohólico de Aesculus hippocastanum 60 % (1:4) (equivalente a 2,5 mg de $\beta$ -escina).	0,160 mL
Alcohol etílico 0,188 mL	
Propilenglicol 0,311 g	
<b>Plazo de validez:</b>	Vidrio ámbar: 24 meses PET ámbar: 12 meses.
<b>Condiciones de almacenamiento:</b>	Almacenar por debajo de 30 °C. Protéjase de la luz.

### Indicaciones:

Insuficiencia vascular periférica

### Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los componentes.

### Precauciones:

Usar con precaución en pacientes con diabetes e hipoglicemia y en aquellos que tomen medicamentos que afecten la glicemia en sangre. Se deben monitorear los niveles de glucosa.

Usar con precaución en pacientes con trastornos de la coagulación o que tomen medicamentos que pueden incrementar el riesgo de sangramiento.

La dosis del medicamento debe ajustarse en estos casos.

Contiene etanol, tener precaución en pacientes con enfermedades hepáticas, alcoholismo, epilepsia, embarazo, lactancia y niños.

Evitar conducir o manejar maquinarias peligrosas.

**Advertencias especiales y precauciones de uso:**

Contiene etanol, puede disminuir la capacidad para conducir o usar maquinarias. Puede alterar los efectos de otros medicamentos.

Contiene propilenglicol, puede producir síntomas parecidos a los del alcohol.

**Efectos indeseables:**

Ocasionales: alteraciones gastrointestinales.

**Posología y modo de administración:**

15 a 20 gotas cada 8 horas

**Interacciones con otros productos medicinales y otras formas de interacción:**

No se reportan.

**Uso en embarazo y lactancia:**

Embarazo: Categoría de riesgo C. Solamente debe ser administrado si el posible efecto deseado justifica el riesgo potencial en el feto.

**Efectos sobre la conducción de vehículos / maquinarias.**

Contiene etanol, puede disminuir la capacidad para conducir o usar maquinarias

**Sobredosis:**

Medidas generales.

**Propiedades farmacodinámicas:**

Disminuye la fragilidad capilar.

**Propiedades farmacocinéticas (absorción, distribución, biotransformación, eliminación):**

No se han reportado hasta la fecha,

**Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto.**

No se ha reportado hasta la fecha.

**Fecha de aprobación / revisión del texto:** 21 de junio de 2016.