

## RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

<b>Nombre del producto:</b>	TAB A VITE®
<b>Forma farmacéutica:</b>	Tableta
<b>Fortaleza:</b>	-
<b>Presentación:</b>	Frasco de PEAD con 100 tabletas.
<b>Titular del Registro Sanitario, país:</b>	MEDICARIBE S.A., LA HABANA, CUBA.
<b>Fabricante, país:</b>	MAJOR PHARMACEUTICALS, LIVONIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
<b>Número de Registro Sanitario:</b>	004-17D3
<b>Fecha de Inscripción:</b>	17 de enero de 2017
<b>Composición:</b>	

Cada tableta contiene:

Vitamina A (como acetato)	
Vitamina C (como ácido ascórbico)	5000 UI
Vitamina D-3 (como colecalciferol)	60,0 mg
Vitamina B-1 (como clorhidrato de tiamina)	400 UI 1,5 mg
Vitamina B-2 (riboflavina)	1,7 mg
Niacinamida (como vitamina B-3)	20,0 mg
Vitamina B-6 (como clorhidrato de piridoxina)	2,0 mg 0,4 mg
Ácido fólico	6,0 mcg
Vitamina B-12 (como cianocobalamina)	

**Plazo de validez:** 24 meses

**Condiciones de almacenamiento:** Almacenar por debajo de 30 °C.

### Indicaciones terapéuticas:

Las multivitamínicas son combinaciones de diferentes vitaminas que normalmente se encuentran en las comidas o en otras fuentes naturales.

Las multivitamínicas se indican para entregar al cuerpo las vitaminas que se toman en su dieta.

También se usan para el tratamiento de deficiencias vitamínicas (falta de vitaminas) causadas por enfermedad, embarazo, nutrición deficiente, problemas de la digestión y varias otras condiciones.

**Contraindicaciones:**

Informe a su médico si está embarazada, o pretende estarlo o si está lactando.

**Precauciones:**

Evite tomar más de una multivitamínicas al mismo tiempo.

**Advertencias especiales y precauciones de uso:**

Tome multivitamínicas con un vaso de agua lleno, preferentemente con las comidas.

**Efectos indeseables:**

Varias vitaminas pueden causar efectos secundarios de gravedad o que pongan su vida en peligro si las tomas en cantidades grandes.

Los efectos secundarios que se presentan de mayor gravedad son: ronchas, dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, lengua y garganta.

Los de menor gravedad incluyen: malestar estomacal, dolor de cabeza. Sabor desagradable en la boca.

**Posología y método de administración:**

Adultos una tableta al día en una de las comidas.

**Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:**

Las multivitamínicas pueden influenciar en cómo funcionan en el organismo si se unen a algunos medicamentos.

Dígale a su médico si está usando: diuréticos, cardiotónicos, antihipertensivos, tetrinoína, isotretinoína, trimetropina y sulfametoxazol, algún antiinflamatorio no esteroideo (AINES) y productos herbarios.

**Uso en Embarazo y lactancia:**

No tome multivitamínicas sin primero conocer si está embarazada o si pretende estarlo, ya que algunas vitaminas pueden hacerle daño al bebé neonato si se toman en grandes cantidades.

Las multivitamínicas pueden pasar a la leche materna por lo que pueden hacer daño al niño.

**Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:**

No procede.

**Sobredosis:**

Busque atención médica si considera que ha tomado una sobredosis. Los síntomas de la sobre dosis pueden incluir: dolor de estómago, vómitos, diarreas, estreñimiento, pérdida del apetito, perdida del cabello, piel que se pela, cosquilleo alrededor de la boca, cambios en el periodo menstrual, pérdida de peso, dolor de cabeza agudo, dolor muscular o de las articulaciones, dolor de espalda intenso, sangre en la orina, piel pálida y sangrar o tener moretones con facilidad.

**Propiedades farmacodinámicas:**

No se presenta en la bibliografía.

**Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):**

No se presenta en la bibliografía.

**Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:**

No procede.

**Fecha de aprobación/ revisión del texto:** 17 de enero de 2017.