CECMED
CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
Ministerio de Salud Pública de Cuba

# RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| **Nombre del producto:** | **MANGISAN®**<br>(Mangifera Indica L) |
| **Forma farmacéutica:** | Tableta |
| **Fortaleza:** | 300 mg |
| **Presentación:** | Frasco de PEAD con 50 tabletas. |
| **Titular del Registro Sanitario, país:** | EMPRESA LABORATORIO FARMACÉUTICO ORIENTE, SANTIAGO DE CUBA, CUBA. |
| **Fabricante, país**: | EMPRESA LABORATORIO FARMACÉUTICO ORIENTE. ESTABLECIMIENTO: PLANTA 1 TABLETAS Y POLVOS. |
| **Número de Registro Sanitario:** | N-14-111-V03 |
| **Fecha de Inscripción:** | 16 de mayo de 2014 |
| **Composición:** | |
| Cada tableta contiene: | |
| Mangifera indica L., corteza del árbol de mango, extracto acuoso seco (eq a 115 mg de polifenoles totales expresados como taninos.) | 300 mg |
| **Plazo de validez:** | 36 meses. |
| **Condiciones de almacenamiento:** | Almacenar por debajo de 30 ºC. Protéjase de la luz. |

**Indicaciones terapéuticas:**
Coadyuvante de la terapia establecida en las enfermedades que tengan un componente doloroso y/o inflamatorio. Suplemento nutricional antioxidante.

**Contraindicaciones:**

No debe ser administrado a pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la formulación. No administrar en caso de embarazo o lactancia ya que no existen estudios amplios de teratogénesis en animales o fetotoxicidad.

**Precauciones:**
No debe emplearse como tratamiento único en ninguna de las patologías relacionadas anteriormente, pues aunque origina remisión de la enfermedad en muchos casos, no está demostrada aún su acción directa, sólo se empleará como complemento de las terapias habituales.

**Advertencias especiales y precauciones de uso:**
Manténgase alejado del alcance de los niños.

**Efectos indeseables:**

Se ha reportado de forma excepcional, disminución de la vigilia en algunos pacientes, prurito.

**Posología y modo de administración:**
En adultos: de 3 a 6 tabletas diarias, media hora antes de ingerir cualquier alimento.

**Interacciones con otros productos medicinales y otras formas de interacción:**
No se conoce ninguna hasta el momento.

**Uso en embarazo y lactancia:**

No reportados.

**Efectos sobre la conducción de vehículos / maquinarias:**

No se han reportado hasta la fecha.

**Sobredosis:**

No procede.

**Propiedades farmacodinámicas, farmacocinéticas (absorción, distribución, biotransformación, eliminación):**

Tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. No es tóxica por vía oral ni tópica (piel y mucosas).

**Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto.**

No procede.

**Fecha de aprobación / revisión del texto:** 28 de febrero de 2017.