

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	ELECTROLITOS ORALES
Forma farmacéutica:	Polvo
Fortaleza:	-
Presentación:	Estuche por 25 sobres de CELOPOLIAL con 27,9 g cada uno. Sobre de CELOPOLIAL con 27,9 g.
Titular del Registro Sanitario, país:	NOVAG INFANCIA S.A. DE C.V., MÉXICO D.F., MÉXICO.
Fabricante, país:	NOVAG INFANCIA S.A. DE C.V., MÉXICO D.F., MÉXICO.
Número de Registro Sanitario:	M-17-059-B05
Fecha de Inscripción:	3 de mayo de 2017
Composición:	
Cada sobre contiene:	
Glucosa	20,0 g
Cloruro de potasio	1,5 g
Citrato trisódico dihidratado	2,9 g
Cloruro de sodio	3,5 g
Plazo de validez:	60 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C.

Indicaciones terapéuticas:

Polvo para solución oral está indicado en todos aquellos casos en que se necesite administrar agua, glucosa y electrólitos por la vía oral, para el manejo, la prevención y el tratamiento de la deshidratación y el desequilibrio electrolítico, tanto del niño como del adulto, consecutivo a evacuaciones diarreicas, sudoración y diuresis excesivas, fiebre, etc.

Contraindicaciones:

Está contraindicado cuando la vía oral está restringida, como en el ileo paralítico perforación u obstrucción intestinal. En caso de vómitos severos se recomienda administrarlo muy lentamente (solo en caso de no haber tolerancia, el vómito se convierte en una contraindicación).

Advertencias especiales y precauciones de uso:

Debido al contenido del ión sodio y glucosa se debe tener precaución al usarlo en pacientes con trastornos renales y en diabéticos.

Efectos indeseables:

Rara vez se ha presentado hipernatremia y edema que deberán ceder al suspender el tratamiento.

Posología y método de administración:

Lactantes y niños: Ofrezca a cucharadas a intervalos cortos y regulares, mientras exista diarrea o según indique el médico. Continúe la alimentación habitual.

Niños mayores y adultos: Tomar a voluntad según propia necesidad o sed del paciente o según indicación del médico. Continúe la alimentación habitual.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

El uso de electrolitos orales en casos y a las dosis recomendadas no presenta ninguna interacción conocida con algún medicamento o alimento.

Uso en Embarazo y lactancia:

Puede administrarse en pacientes embarazadas o en madres lactando siempre y cuando no haya una restricción médica del sodio y las condiciones renales y cardiovasculares de la paciente sean normales

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias: NA**Sobredosis:**

El exceso del consumo de Electrolitos Orales fuera de indicación médica puede acarrear problemas de hipernatremia y edema, todo en aquellos pacientes con alteración renal o cardiovascular importante. Adminístrense de 20 a 40 mg diarios de furosemida por la vía oral hasta que desaparezca el edema y se normalice la presión arterial. Prevengáse la probable aparición de hipocaliemia guardando un régimen alimenticio rico en potasio.

Propiedades farmacodinámicas:

Polvo para solución oral, es una solución rehidratante para la prevención y corrección de la deshidratación en niños con diarrea aguda. Es eficaz y seguro tanto en pacientes con deshidratación hipoatrémica, isonatrémica como hipernatrémica.

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

Al mantener una concentración de glucosa al 2%, una relación en mEq de glucosa/sodio entre 1.23 y 1.85 con una osmolaridad semejante a la del plasma, es esencial para favorecer la absorción intestinal de agua y solutos.

La adición de citrato a la fórmula, permite la corrección más temprana de la acidosis metabólica en niños deshidratados por diarrea aguda y disminuye la frecuencia y gravedad de los síntomas y el índice de fracasos de la terapia de hidratación oral.

Electrolitos orales, expande al espacio intravascular y repone el potasio intracelular. Su osmolaridad y concentración proporcional de glucosa y sodio promueven la óptima absorción de agua y electrolitos. El citrato favorece esta absorción así como la incorporación de potasio a la célula.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto: Lávese las manos. En un litro de agua limpia, disuelva todo el contenido de un sobre. Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco. Después de 24 horas tire el sobrante del suero.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 3 de mayo de 2017.