

## RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO HOMEOPÁTICO

**Nombre del producto:** ALIVIHo® -ASMA

**Origen del material de partida:** Animal, Vegetal.

**Forma farmacéutica:** Gotas sublinguales

**Grado de dilución o potenciación:** 12 CH

**Presentación:** Estuche por 1, 6, ó 12 frascos gotero de vidrio ámbar con 30 mL.

Estuche por 1, 9, ó 12 frascos gotero de vidrio ámbar con 15 mL.

**Titular, dirección país:** Grupo Empresarial de Producciones Biofarmacéuticas y Químicas.

LABIOFAM, Cienfuegos, Cuba.

**Fabricante, dirección, país:** Grupo Empresarial de Producciones Biofarmacéuticas y

Químicas. LABIOFAM, Cienfuegos, Cuba.

**Número de Registro Sanitario:** H17-113-V03

**Fecha de inscripción:** 2 agosto 2017

### Material de partida:

Tintura madre homeopática a partir de las Reglas de preparación Hahnemannianas 1/100 de *Aconitum napellus*, *Aralia racemosa*, *Arsenicum iodatum*, *Blatta orientalis*, *Carbo vegetabilis*, *Drosera rotundifolia*, *Rumex crispus*, *Spongia tosta*.

**Plazo de validez:** 24 meses

**Condiciones de almacenamiento:** Protéjase de la luz. No refrigerar. Mantenga el frasco dentro del estuche.

### Usos recomendados:

Medicamento Homeopático utilizado como tratamiento auxiliar para las crisis de asma incluyendo la tos y la dificultad para respirar.

La acción clínica de cada componente para esta indicación es la siguiente:

Componente	Coadyuva al alivio de:
<i>Aconitum napellus</i>	– Disnea, hiperventilación estertorosa.
<i>Aralia racemosa</i>	– Tos seca y espasmódica
<i>Arsenicum iodatum</i>	– Inquietud, asma, tos, bronquitis crónicas, irritación de membranas, agotamiento
<i>Blatta orientalis</i>	– Bronquitis, disnea,
<i>Carbo vegetabilis</i>	– Disnea, cianosis, tos, agotamiento, fatiga
<i>Drosera rotundifolia</i>	– Tos espasmódica, respiración asmática
<i>Rumex crispus</i>	– Irritación de garganta y ronquera, dolor en el pecho.
<i>Spongia tosta</i>	– Sequedad de vías respiratorias, disnea, respiración

**Contraindicaciones:**

Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes.

**Precauciones:**

El uso de este producto no excluye, sustituye o limita la aplicación de otros tratamientos. Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que en niños menores de 10 años, Embarazo, Lactancia, Geriatria y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluir 5 gotas en ¼ vaso de agua.

**Advertencias especiales y precauciones de uso.**

No manipular o administrar este producto en presencia de olores fuertes (perfume, tabaco, ambientadores, mentol, desinfectantes, etc.). No administrar junto con comidas o bebidas. Se recomienda, no fumar, beber, comer o lavarse los dientes 20 minutos antes y después de la administración. Mantener alejado de equipos electrónicos que generen ondas electromagnéticas fuertes (Televisores, microondas, computadoras, celulares, radios, teléfonos inalámbricos, refrigeradores, etc). En caso de aparición de síntomas severos asociados a los usos recomendados u otros signos no relacionados, se debe acudir al médico.

**Efectos indeseables:**

No se han descrito.

**Posología y modo de Administración.**

Se recomienda la administración de una dosis (5 gotas) 4 veces al día durante al menos 5 días. En caso de agudización de los síntomas, puede administrarse una dosis (5 gotas) cada 1 h y luego, en la medida en que se alcance la mejoría, disminuir gradualmente la frecuencia hasta la posología recomendada de 4 dosis diarias. Se recomienda no exceder los 21 días de tratamiento. Durante el tratamiento deben respetarse los horarios de sueño.

**Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacciones:**

No se han descrito.

**Uso en Embarazo y lactancia.**

Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que en niños menores de 10 años, Embarazo, Lactancia, Geriatria y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluirlo en ¼ vaso de agua.

**Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias.**

No se han descrito.

**Sobredosis:**

Medidas generales.

**Otras propiedades atribuidas o demostradas:**

No se presentan.

**Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:**

Antes de administrar cada dosis se sugiere golpear al menos 10 veces el frasco contra la palma de la mano. Se recomienda la administración sublingual con la boca completamente limpia y libre de olores fuertes y cualquier sabor. Por lo que no se debe comer, beber, cepillarse los dientes ni fumar 20 minutos antes o después de la administración del medicamento. En caso de administrar el producto diluido en agua potable (1/4 vaso), este se debe retener en la boca durante 5 segundos garantizando el contacto sublingual. Se recomienda además evitar el contacto del cuentagotas, el interior de la tapa o el medicamento con las manos o labios. Se sugiere dispensar previamente cada dosis (5 gotas) en la tapa del frasco y luego administrar debajo de la lengua.

**Fecha de aprobación/revisión del texto.** 1 julio de 2017.

