

RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto: VIDATOX[®] 30 CH
(Veneno de Rhopalurus junceus)

Origen del material de partida: Origen Animal.

Forma farmacéutica: Gotas sublinguales.

Grado de dilución o potenciación: 30 CH

Presentación: Estuche por un frasco de vidrio ámbar con 30 mL.

Estuche por 6 o 12 frascos de vidrio ámbar con 30 mL cada uno.

Titular, dirección, país: GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACÉUTICAS Y QUÍMICAS. LABIOFAM, LA HABANA, CUBA.

Fabricante, dirección, país: EMPRESA LABIOFAM CIENFUEGOS, UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE (UEB) DE PRODUCCIONES FARMACÉUTICAS Y VETERINARIAS, ESTABLECIMIENTO LABORATORIO DE HOMEOPATÍA, CIENFUEGOS, CUBA

Número de Registro Sanitario: H-11-038-N02

Fecha de inscripción: 15 marzo 2011

Material de partida:

Veneno de Rhopalurus junceus 30 CH 0,01 mL

Plazo de validez: 30 meses.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar por debajo de 30 °C. Protéjase de la luz

Usos recomendados:

Terapia complementaria para el tratamiento de síntomas provocados por los efectos del cáncer, alivio del dolor.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes. Niños menores de un año.

Precauciones:

Embarazo. Lactancia. Evitar los olores fuertes en el momento de su administración. Se recomienda, no fumar, beber o comer 20 minutos antes y después de la administración. Mantener alejado de equipos electrónicos que generen ondas electromagnéticas fuertes.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

El uso de este producto no excluye o limita la aplicación de otros tratamientos convencionales contra las neoplasias. Si los síntomas persisten o empeoran debe consultar a su médico.

Efectos indeseables:

No se han reportado hasta la fecha.

Posología y modo de administración:

5 gotas sublinguales cada 12 horas. Si el paciente no tolera el medicamento directo en su boca por el grado alcohólico que contiene o por lesiones en las vías digestivas se sugiere añadir en 15 mL (1 cucharada) de agua hervida o purificada 5 gotas del medicamento. Administrar esta solución cada 12 horas a través de la sonda de gastrostomía.

Se recomienda la administración sublingual con la boca completamente limpia y libre de olores fuertes y cualquier sabor. Por lo que no se debe comer, beber, cepillarse los dientes ni fumar después de la administración (15 – 30 minutos antes o después).

Interacciones con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No se han reportado hasta la fecha.

Uso en embarazo y lactancia:

No se sugiere su uso en el embarazo y la lactancia.

Efectos sobre la conducción de vehículos / maquinarias:

No se han reportado hasta la fecha.

Sobredosis:

Medidas generales.

Otras propiedades atribuidas o demostradas:

La formulación de partida del veneno provoca una disminución significativa de la progresión del tumor dosis dependiente. Mostró efecto antiangiogénico. Se han realizado estudios sobre el efecto analgésico en el modelo de contorsiones por ácido acético y plato caliente. La actividad antiinflamatoria se demostró en el modelo de edema auricular por aceite de crotón en el ratón y la inflamación por pellets de algodón. Se demostró el efecto antiangiogénico del producto en el modelo de angiogénesis inflamatoria por adyuvante.

Instrucciones de uso y manipulación del producto: No procede

Fecha de aprobación /revisión del texto: 15 de mayo de 2016.