

ACTUALIZACIÓN EN EL REINO UNIDO DE ADVERTENCIAS ESPECIALES Y PRECAUCIONES DE USO DEL PRODUCTO LODOTRA®, TABLETAS CON 5 MG DE PREDNISONA

El día 7 de marzo la Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe (CIMLAC) ha emitido una noticia sobre la actualización en el Reino Unido del resumen de características del producto Lodotra®, tabletas con 5 mg de prednisona, para agregar información en el apartado de advertencias especiales y precauciones de uso.

Sección 4.4 – Precauciones y advertencias:

Trastorno visuales

Se informa casos de alteración visual con el uso sistémico y tópico de corticosteroides. Si un paciente presenta síntomas tales como visión borrosa u otras alteraciones visuales, se debe valorar al paciente para derivarlo a un oftalmólogo para la evaluación de posibles causas que pueden incluir cataratas, glaucoma o enfermedades raras como coriorretinopatía serosa central, que ha sido informada después del uso de corticosteroides sistémicos y tópicos.

Crisis renal esclerodérmica

Se requiere precaución en pacientes con esclerosis sistémica debido a un aumento de la incidencia de crisis renal esclerodérmica (posiblemente mortal) con hipertensión y disminución de la diuresis observada con dosis diaria de prednisolona de 15 mg o mayor. Por lo tanto, la presión arterial y la función renal (creatininemia) deben controlarse de forma rutinaria. Cuando se sospecha una crisis renal, la presión arterial debe controlarse cuidadosamente.

Disponible en:

http://web2.redcimlac.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2058:prednisona-trastornos-visuales-y-crisis-renal-esclerodermica&catid=4:noticias-de-interes&Itemid=31

<https://www.medicines.org.uk/emc/product/7650/smpc>

La Habana, 14 de marzo de 2018