

## RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**Nombre del producto:** ALIVIHo® -INMUNE

**Forma farmacéutica:** Gotas sublinguales

**Grado de dilución o potenciación:** 9-12 CH

**Presentación:** Estuche por 1, 6, ó 12 frascos gotero de vidrio ámbar con 30 mL.

Estuche por 1, 9, ó 12 frascos gotero de vidrio ámbar con 15 mL

**Titular de Registro Sanitario, país:** Instituto Finlay Centro de Investigación-Producción de Vacunas y sueros, Cuba.

**Fabricante, país:** Instituto Finlay Centro de Investigación-Producción de Vacunas y sueros, Cuba.

**Número de Registro Sanitario:** H-12-057-V03

**Fecha de inscripción:** 4 de abril de 2012.

**Material de partida:**

Cada mL (20 gotas) contiene:

Tintura madre homeopática a partir de las Reglas de preparación Hahnemannianas 1/100 de *Arsenicum álbum*, *Calcarea sulfúrica*, *Hepar Sulfur*, *Natrum Muriaticum*, *Silicea*, *Sulfur iodatum*, *Thuja occidentalis*, *Zingiber officinale*

**Plazo de validez:** 24 meses

**Condiciones de almacenamiento:** Protéjase de la luz. No refrigerar. Mantenga el frasco dentro del estuche.

**Usos recomendados:** Medicamento Homeopático utilizado como tratamiento auxiliar para la estimulación del sistema inmune, particularmente en pacientes en períodos de convalecencias en síntomas asociados a infecciones recurrentes y crónicas, amigdalitis, bronquitis, tos seca e improductivas, catarros persistentes, inflamaciones crónicas. Otras como, afecciones cutáneas, forúnculos, trastornos digestivos e inflamación de las mucosas y el intestino, así como también es preventivo para tratar síndromes depresivos.

**Contraindicaciones:**

Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes.

**Precauciones:**

El uso de este producto no excluye, sustituye o limita la aplicación de otros tratamientos..

El producto contiene etanol al 30 % por lo que en niños menores de 10 años Embarazo, Lactancia, Geriatria y en personas sensibles (desórdenes hepáticos y alcoholismo) recomendamos diluirlo previamente en ¼ vaso de agua.

**Advertencias especiales y precauciones de uso:**

No administrar junto con olores fuertes, comidas o bebidas. Se recomienda no fumar, comer o beber 20 minutos antes y después de la administración. Mantener alejado de equipos electrónicos que generen ondas electromagnéticas fuertes. En caso de aparición de

síntomas severos asociados a los usos recomendados u otros signos no relacionados, se debe acudir al médico.

**Efectos indeseables:**

No se han reportado hasta la fecha.

**Posología y modo de administración.**

Se recomienda, la administración de una dosis (5 gotas) 4 veces al día, durante al menos 5 días, sin exceder los 10 días de tratamiento. En los casos con sintomatología aguda, que cause mucha molestia al paciente, puede administrarse una dosis (5 gotas) del producto cada 15 minutos hasta alcanzar alivio de los síntomas, sin exceder las 10 dosis (50 gotas) en 24 horas. Una vez alcanzado el alivio de la sintomatología inicial deben espaciarse gradualmente los intervalos entre dosis hasta lograr la posología recomendada (4 dosis diarias). En ninguno de los casos deben administrarse más de 10 dosis diarias (50 gotas).

**Interacciones con otros productos medicinales y otras formas de interacción:**

No se han reportado hasta la fecha.

**Uso en embarazo, lactancia y niños**

No existen restricciones en cuanto a la lactancia, embarazos y niños menores de 10 años. En estos casos se recomienda diluirlo previamente en ¼ vaso de agua potable.

**Efectos sobre la conducción de vehículos / maquinaria:**

Medidas generales.

**Sobredosis:**

Medidas generales

**Otras propiedades atribuidas o demostradas.**

No se han reportado hasta la fecha.

**Instrucciones de uso y manipulación del producto.**

Antes de administrar cada dosis se sugiere golpear al menos 10 veces el frasco contra la palma de la mano. Se recomienda la administración sublingual con la boca completamente limpia y libre de olores fuertes y cualquier sabor. Por lo que no se debe comer, beber, cepillarse los dientes ni fumar 10 – 20 minutos antes o después de la administración del medicamento. En caso de administrar el producto diluido en agua (1/4 vaso), este se debe retener en la boca durante 5 segundos garantizando el contacto sublingual. Se recomienda además evitar el contacto del cuentagotas, el interior de la tapa o el medicamento con las manos o labios. Se sugiere dispensar previamente cada dosis (5 gotas) en la tapa del frasco y luego administrar debajo de la lengua.

**Fecha de aprobación/revisión del texto:** 25 de enero de 2018.