

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	ANIMAL SHAPES WITH IRON
Forma farmacéutica:	Tableta masticable
Fortaleza:	----
Presentación:	Frasco de PEAD con 100 tabletas masticables.
Titular del Registro Sanitario, país:	MEDICARIBE S.A., La Habana, Cuba.
Fabricante, país:	MAJOR PHARMACEUTICALS, Livonia, Estados Unidos de América.
Número de Registro Sanitario:	060-18D3
Fecha de Inscripción:	17 de septiembre de 2018
Composición:	

Cada tableta masticable contiene:

Vitamina A	3000 UI
Vitamina C	60,00 mg
Vitamina D	600,00 UI
Vitamina E	30,00 UI
Vitamina K	55,00 mcg
Vitamina B-1	1,500 mg
Vitamina B-2	1,700 mg
Niacinamida	15,00 mg
Vitamina B-6	2,00 mg
Ácido Fólico	0,40 mg
Vitamina B-12	6,00 mcg
Biotina	40,00 mcg
Ácido Pantoténico	10,00 mg
Calcio	100,00 mg
Hierro	18,00 mg
Yoduro	150,00 mcg
Zinc	12,00 mg
Cobre	2,00 mg
Ascorbato de sodio	21,00 mg

Sorbitol
Azúcar
Manitol

Plazo de validez: 24 meses

Condiciones de almacenamiento: Almacenar por debajo de 30 °C.

Indicaciones terapéuticas:

Las multivitamínicas son combinaciones de diferentes vitaminas que normalmente se encuentran en las comidas o en otras fuentes naturales.

Las multivitamínicas se indican para entregar al cuerpo las vitaminas que se toman en su dieta.

También se usan para el tratamiento de deficiencias vitamínicas (falta de vitaminas) causadas por enfermedad, embarazo, nutrición deficiente, problemas de la digestión y varias otras condiciones.

Contraindicaciones:

No tome multivitamínicas con leche o productos con base de leche, suplemento de calcio o antiácidos que contengan calcio. El calcio puede hacer más difícil para que su cuerpo pueda absorber algunos de los ingredientes de la multivitamínicas.

Contiene sorbitol, no administrar en pacientes con intolerancia a la fructosa.

Contiene sacarosa, no administrar en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, mala absorción a la glucosa o galactosa o deficiencia de sacarasa isomaltasa.

Precauciones:

Evite tomar más de una multivitamínicas al mismo tiempo.

Pacientes con diabetes mellitus

Advertencias especiales y precauciones de uso:

Tome multivitamínicas con un vaso de agua lleno, masticando las tabletas previamente.

No tome multivitamínicas sin primero conocer si está embarazada o si pretende estarlo, ya que algunas vitaminas pueden hacerle daño al bebé neonato si se toman en grandes cantidades.

Las multivitamínicas pueden pasar a la leche materna por lo que pueden hacer daño al niño.

En niños el producto debe ser indicado por prescripción facultativa, ya que el exceso de hierro puede traer intoxicaciones fuertes para los mismos.

Contiene manitol, puede provocar un ligero efecto laxante.

Efectos indeseables:

Varias vitaminas pueden causar efectos secundarios de gravedad o que pongan su vida en peligro si las tomas en cantidades grandes.

Los efectos secundarios que se presentan de mayor gravedad son: ronchas, dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, lengua y garganta. Los de menor gravedad incluyen: malestar estomacal, dolor de cabeza. Sabor desagradable en la boca, estreñimiento.

Posología y método de administración:

Adultos y niños mayores de 4 años una tableta al día en una de las comidas.

Para niños de 2 a 3 años ½ tableta al día igualmente en una de las comidas, siempre bajo prescripción facultativa.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

Las multivitaminas pueden influenciar en cómo funcionan en el organismo si se unen a algunos medicamentos.

Dígale a su médico si está usando: diuréticos, cardiotónicos, antihipertensivos, tetrinoina, isotretinoina, trimetropina y sulfametoxazol, algún antiinflamatorio no esteroideo (AINES) y productos herbarios.

Uso en Embarazo y lactancia:

No tome multivitaminas sin primero conocer si está embarazada o si pretende estarlo, ya que algunas vitaminas pueden hacerle daño al bebé neonato si se toman en grandes cantidades.

Las multivitaminas pueden pasar a la leche materna por lo que pueden hacer daño al niño.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No procede.

Sobredosis:

Busque atención médica si considera que ha tomado una sobredosis.

Las sobredosis de hierro pueden ser severas sobre todo en niños.

Los síntomas de la sobre dosis pueden incluir: dolor de estómago, vómitos, diarreas, estreñimiento, pérdida del apetito, pérdida del cabello, piel que se pela, cosquilleo alrededor de la boca, cambios en el periodo menstrual, pérdida de peso, dolor de cabeza agudo, dolor muscular o de las articulaciones, dolor de espalda intenso, sangre en la orina, piel pálida y sangrar o tener moretones con facilidad.

Propiedades farmacodinámicas:

No se ha reportado hasta la fecha.

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

No se ha reportado hasta la fecha.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No procede.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 17 de septiembre de 2018.