



RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO HOMEOPÁTICO

Nombre del producto: TRATHO– CÓLERA, gotas sublinguales

Origen del material de partida: Vegetal, biológico y mineral

Forma farmacéutica: Gotas sublinguales

Grado de dilución o potenciación: 30CH

200CK

Presentación: Estuche por un frasco de vidrio ámbar con tapa-gotero de PP con 15 ó 30 mL.

Titular, país: GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACÉUTICAS Y QUÍMICAS, LABIOFAM, La Habana, Cuba.

Fabricante, país: EMPRESA LABIOFAM CIENFUEGOS, Cienfuegos, Cuba.

UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE (UEB) PRODUCCIONES FARMACÉUTICAS Y VETERINARIAS. Laboratorio de homeopatía.

Número de Registro Sanitario: H-18-048-V03

Fecha de Inscripción: 25 de junio 2018

Material de partida: Carbo vegetabilis, Colibacillinum, Cuprum metallicum, Echinacea angustifolia, Veratrum álbum, Nosode Cólera, Remedio de rescate, Crap Apple.

Plazo de validez: 24 meses

Condiciones de almacenamiento: Protéjase de la luz. No refrigerar. Manténgase el frasco dentro del estuche.

Usos recomendados:

Medicamento Homeopático recomendado como tratamiento auxiliar enfermedades diarreicas agudas y síntomas clínicos compatibles con cólera.

La acción clínica de cada componente para el uso recomendado es la siguiente:

Componente	Coadyuva al tratamiento de:
<i>Carbo vegetabilis</i>	- Desmayos, colapso: escalofrío, transpiración, debilidad
<i>Colibacillinum</i>	- Infección por bacterias entéricas patógenas, colibacilosis,
<i>Cuprum metallicum</i>	- Diarrea, deshidratación, pérdida de líquidos, desbalance de electrolitos, calambres.
<i>Echinacea angustifolia</i>	- Sepsis e infecciones.
<i>Veratrum album</i>	- Diarrea profusa y acuosa, vómitos, debilidad, colapso, escalofrío, frío corporal, postración.
<i>Nosode Cólera</i>	- Infección por <i>Vibrio cholerae</i>
<i>Remedio de rescate</i>	- Primeros auxilios para urgencias medicas

<i>Crap apple</i>	- Desesperación, abatimiento, desequilibrios mentales relacionado a procesos infecciosos, desintoxicación
-------------------	---

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes.

Precauciones:

El uso de este producto no excluye, sustituye o limita la aplicación de otros tratamientos o medidas higiénicas sanitarias para el control de la enfermedad. Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que en niños menores de 10 años, Embarazo, Lactancia, Geriatria y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluirlo en ¼ vaso de agua.

Advertencias especiales y precauciones de uso.

No manipular o administrar este producto en presencia de olores fuertes (perfume, tabaco, ambientadores, mentol, desinfectantes, etc.). No administrar junto con comidas o bebidas. Se recomienda, no fumar, beber, comer o lavarse los dientes 20 minutos antes y después de la administración. Mantener alejado de equipos electrónicos que generen ondas electromagnéticas fuertes (televisores, microondas, computadoras, celulares, radios, teléfonos inalámbricos, refrigeradores, etc). En caso de aparición de síntomas severos asociados a los usos recomendados u otros signos no relacionados, se debe acudir al médico.

Efectos indeseables:

No se han descrito.

Posología y modo de Administración.

Se recomienda la administración de una dosis (5 gotas) 2 veces al día durante al menos 2 días y continuar con una dosis diaria hasta la recuperación completa de los síntomas.

Se recomienda no exceder los 10 días de tratamiento. Durante el tratamiento deben respetarse los horarios de sueño.

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacciones:

No se han descrito

Uso en Embarazo y lactancia.

Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que en niños menores de 10 años, embarazo, lactancia, geriatria y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluirlo en ¼ vaso de agua.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias.

No se han descrito.

Sobredosis:

No se han descrito

Otras propiedades atribuidas o demostradas.

No se han reportado hasta la fecha.

Instrucciones de uso y manipulación del producto:

Antes de administrar cada dosis se sugiere golpear al menos 10 veces el frasco contra la palma de la mano. Se recomienda la administración sublingual con la boca completamente limpia y libre de olores fuertes y cualquier sabor. Por lo que no se debe comer, beber, cepillarse los dientes ni fumar 20 minutos antes o después de la administración del medicamento. En caso de administrar el producto diluido en agua potable (1/4 vaso), este se debe retener en la boca durante 5 segundos garantizando el contacto sublingual. Se recomienda además evitar el contacto del cuentagotas, el interior de la tapa o el medicamento con las manos o labios. Se sugiere dispensar previamente cada dosis (5 gotas) en la tapa del frasco y luego administrar debajo de la lengua.

Fecha de aprobación/revisión del texto. 30 de junio 2018.