

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	Vinilin® (Bálsamo de Schostacovsky)
Forma farmacéutica:	Solución oral y tópica
Fortaleza:	91,7 g/mL
Presentación:	Estuche por un frasco de vidrio ámbar con 50 g. Estuche por un frasco de vidrio ámbar con 100 g. Estuche por un frasco PP ámbar con 50 g. Estuche por un frasco PP ámbar con 100 g.
Titular del Registro Sanitario, país:	ARG GROUP INC., CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ.
Fabricante, país:	SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (SAA) "ORGSINTEZ", NIZHNY NOVGOROD, RUSIA. Ingrediente farmacéutico activo JSC "VITAMINY", UMAN, UCRANIA. Producto terminado
Número de Registro Sanitario:	M-13-013-D03
Fecha de Inscripción:	31 de Enero 2013
Composición:	
Cada 100 mL contiene:	
Eter polivinil butílico	91,7 g
Plazo de validez:	60 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 25 °C. Protéjase de la luz y la humedad.
Indicaciones terapéuticas:	
	Externo: Furúnculos, carbúnculos, úlceras tróficas, heridas purulentas, mastitis, lesiones de tejidos blandos, quemaduras, dermatitis y enfermedades inflamatorias de la piel. Interno: Gastritis, acidez, úlceras de duodeno y del estómago.
Contraindicaciones:	
	Hipersensibilidad individual. Embarazo. Lactancia. Menores de 18 años. Enfermedad del hígado y vesícula.
Precauciones:	
	No se han reportado hasta la fecha.
Advertencias especiales y precauciones de uso:	
	No se han reportado hasta la fecha.

Efectos indeseables:

Raramente hipersensibilidad individual al medicamento: posibles reacciones alérgicas, sobre todo de carácter local.

Posología y modo de administración:

Externo: aplicando en forma de solución de aceite al 20%, incluso en combinación con otros fármacos compatibles con Vinylinum®, (pomadas en base de vaselina y otros, cremas): apósito humedecido directamente a la superficie dañada 3-5 veces al día.

Interno: se recomienda una vez al día pasadas 5-6 horas después de la última toma de alimentos.

En caso de acidez, gastritis, úlceras del duodeno y del estómago: 1 er día- 1 cucharadita, los días posteriores -1 cucharada de postre durante 16-20 días.

En caso de colitis se aplica rectal con rectoscopio 25-30-40 ml de 3 a 9 días.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No tiene.

Uso en Embarazo y lactancia:

Posible uso del medicamento durante el embarazo o la lactancia,

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No procede.

Sobredosis:

No se describen síntomas de sobredosis.

Propiedades farmacodinámicas:

Líquido espeso, viscoso del color amarillo claro con el olor específico. En el aire no se pone espeso y no se seca.

Para el tratamiento de heridas y úlceras.

Para limpiar las heridas de pus, eliminación de tejido muerto, regeneración de tejidos dañados, epitelización de las heridas.

Tiene efecto bacteriostático, antiinflamatorio, de cicatrización de heridas.

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

No se han reportado hasta la fecha.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

Dentro del embalaje bien tapado, en un lugar seco, protegido contra la luz, a la temperatura no mayor de 25 °C. Guardar en un lugar inaccesible para los niños.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 31 de octubre de 2019.