

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	LOCIÓN DE ZINC Y CALAMINA
Forma farmacéutica:	Loción
Fortaleza:	---
Presentación:	Estuche por un frasco de vidrio ámbar con 115 mL.
Titular del Registro Sanitario, país:	EMPRESA LABORATORIO FARMACÉUTICO LÍQUIDOS ORALES, MEDILIP, Bayamo, Cuba.
Fabricante, país:	EMPRESA LABORATORIO FARMACÉUTICO LÍQUIDOS ORALES, MEDILIP, Bayamo, Cuba.
Número de Registro Sanitario:	M-14-093-D04
Fecha de Inscripción:	15 de mayo de 2014
Composición:	
Cada 100 mL contiene:	
Óxido de Zinc	7,5 g
Calamina	7,5 g
(eq. a 5,3 g de óxido de zinc)	
Fenol licuado	0,5 g
(eq. a 0,45 g de fenol)	
Plazo de validez:	24 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C. Protéjase de la luz.
Indicaciones Terapéuticas:	
Irritación leve de la piel (prurito, dolor, malestar)	
Contraindicaciones:	
Hipersensibilidad a la calamina.	
Precauciones:	
Embarazo: Puede prescribirse en cualquier trimestre del embarazo.	
Lactancia materna: compatible.	
Niño y adulto mayor: estudios de seguridad insuficientes	
Advertencias especiales y precauciones de uso:	
Evitar contacto con los ojos y membranas mucosas.	
Efectos indeseables:	
Irritación local o reacciones de hipersensibilidad.	
Posología y modo de administración:	

Aplicación tópica según sea necesario.

Interacciones con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No presenta.

Uso en embarazo y lactancia:

Embarazo: Puede prescribirse en cualquier trimestre del embarazo.

Lactancia materna: compatible.

Efectos sobre la conducción de vehículos/ maquinarias:

No presenta.

Sobredosis:

No se ha presentado.

Propiedades Farmacodinámicas:

ATC: D02AB Productos con Zinc

Los compuestos de cinc se usan como astringentes, antitranspirantes, corrosivos y antisépticos leves. Probablemente deben su acción a la capacidad de ión cinc para precipitar las proteínas, pero otros mecanismos pueden intervenir en el efecto sobre las bacterias (evita la fricción y absorbe la humedad). Además el óxido de cinc tiene efecto protector, al promover la curación de la piel por la reducción de la irritación y la fricción.

Propiedades Farmacocinéticas (absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

Absorción: Se limita a la piel, penetrando en las capas exteriores, no alcanza la circulación general.

Distribución: Se distribuye solamente en el área afectada.

Eliminación: Tópica.

Comienzo de la acción: Rápido.

Duración de la acción: Depende de la preparación y la longitud de contacto con las áreas afectadas.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No presenta.

Fecha de aprobación / revisión del texto: 31 de julio de 2020.