

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO HOMEOPÁTICO

Nombre del producto: VIDATOX® 30CH

Origen del material de partida. Animal

Forma farmacéutica: Gotas sublinguales

Grado de dilución o potenciación: 30CH

Presentación Estuche por 1 frasco de vidrio ámbar con inserto cuenta gotas con 15 mL o 30 mL.

Estuche múltiple por 12 frascos de vidrio ámbar con inserto cuenta gotas con 30 mL cada uno..

Titular, país: GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACÉUTICAS Y QUÍMICAS. LABIOFAM, La Habana, Cuba.

Fabricante, país: EMPRESA LABIOFAM CIENFUEGOS, Cienfuegos, Cuba. UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE PRODUCCIONES FARMACEUTICAS Y VETERINARIAS (UEB). Laboratorio de Homeopatía.

Número de Registro Sanitario: H-11-038-N02

Fecha de Inscripción: 15 de marzo 2011

Material de partida:

Tintura madre homeopática a partir de las Reglas de preparación Hahnemannianas 1/100 de Veneno de *Rhopalurus junceus*

Plazo de validez: 30 meses

Condiciones de almacenamiento: Almacenar por debajo de 30 °C. No refrigerar. Protéjase de la luz. Mantenga el frasco dentro del estuche

Usos recomendados:

Terapia complementaria para el tratamiento del alivio del dolor y síntomas asociados al tumor.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes.

Embarazo. Lactancia.

Precauciones:

Mantener alejado de perfumes y olores fuertes.

No refrigerar y no trasvasar.

Se recomienda, no fumar, beber o comer 20 minutos antes y después de la administración.

Mantener alejado de equipos electrónicos que generen ondas electromagnéticas fuertes.

Advertencias especiales y precauciones de uso

No se han descrito

Efectos indeseables:

No se han descrito.

Posología y modo de administración:

5 gotas sublinguales cada 12 horas.

Si el paciente no tolerara el medicamento directo en su boca por el grado alcohólico que contiene y/o por lesiones en vías digestivas, o tener la vía oral cerrada se sugiere: añadir a 15 mL (1 cucharada) de agua hervida o purificada 5 gotas del medicamento. Administrar esta solución cada 12 horas.

Puede suministrar el medicamento a través de la sonda de gastrostomía.

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacciones:

No se han descrito.

Uso en Embarazo y lactancia.

No se sugiere su uso en embarazadas y niños menores de 1 año.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias.

No se han descrito.

Sobredosis:

Medidas generales.

Otras propiedades atribuidas o demostradas:

No se presentan.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

Antes de administrar cada dosis se sugiere golpear al menos 10 veces el frasco contra la palma de la mano. Se recomienda la administración sublingual con la boca completamente limpia y libre de olores fuertes y cualquier sabor. Por lo que no se debe comer, beber, cepillarse los dientes ni fumar 20 minutos antes o después de la administración del medicamento. En caso de administrar el producto diluido en agua potable (1/4 vaso), este se debe retener en la boca durante 5 segundos garantizando el contacto sublingual. Se recomienda además evitar el contacto del cuentagotas, el interior de la tapa o el medicamento con las manos o labios.

Fecha de aprobación/revisión del texto: 31 de mayo de 2021..

