



RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO HOMEOPÁTICO

Nombre del producto: PREVENGHO®- VIR

Origen del material de partida. Mineral, Vegetal, Animal y Biológico.

Forma farmacéutica: Gotas sublinguales

Grado de dilución o potenciación: 30CH-200CK

Presentación: Estuche por 1 frasco gotero de PEBD blanco con con 5 mL.
Estuche por 12 frascos goteros de PEBD blanco con 5 mL cada uno.

Titular, país: EMPRESA LABORATORIOS AICA, Habana, Cuba.

Fabricante, país: E m p r e s a LABORATORIOS AICA. UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE (UEB, "Laboratorios Julio Trigo"), La Habana, Cuba.

Número de Registro Sanitario: H-20-012-V03

Fecha de Inscripción: 20 de marzo 2020

Material de partida: Tintura madre homeopática a partir de las Reglas de preparación Hahnemannianas 1/100 de : *Bacillinum*, *Crotalus horridus*, Korsakovianas de : *Anaes barbariae*, *Arsenicum album*, *Baptisia tinctoria*, *Bryonia alba*, *Eupatorium perfoliatum*, *Gelsemium sempervirens*, *Pneumococinum*, *Influenzinum*, *Pyrogenium*, *Tuberculinum aviaire* y los *Coadyuvantes florales del sistema Bach: Crab Apple* y *Remedio de rescate*.

Plazo de validez: 24 meses

Condiciones de almacenamiento: Almacenar por debajo de 30 °C. No refrigerar. Protéjase de la luz. Mantenga el frasco dentro del estuche y alejado de los equipos electrodomésticos.

Usos recomendados: Este Medicamento Homeopático se recomienda para la prevención de la influenza, enfermedades gripales, dengue e infecciones virales emergentes. Se recomienda su uso en condiciones de riesgo epidemiológico.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes.

Precauciones: El uso de este producto no excluye, sustituye o limita la aplicación de otros tratamientos. Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que, en niños menores de 10 años, embarazo, lactancia, geriatría y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluir 5 gotas en ¼ vaso de agua.

Advertencias especiales y precauciones de uso: No manipular o administrar este producto en presencia de olores fuertes (perfume, tabaco, ambientadores, mentol, desinfectantes, etc.). No administrar junto con comidas o bebidas. Se recomienda, no fumar, beber, comer o lavarse los dientes 20 minutos antes y después de la administración. Mantener alejado de equipos electrónicos que generen ondas electromagnéticas fuertes (Televisores, microondas, computadoras, celulares, radios, teléfonos inalámbricos, refrigeradores, etc.). En caso de aparición de síntomas severos asociados a los usos recomendados u otros signos no relacionados, se debe acudir al médico.

Efectos indeseables: No se han descrito.

Posología y modo de administración: Para la prevención: 5 gotas debajo de la lengua 1 vez al día por 3 días consecutivos. Tomar otra dosis única de 5 gotas debajo de la lengua una semana después (10^{mo} día).

Recomendable completar el número de dosis del esquema preventivo.

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacciones:

No se han descrito.

Uso en Embarazo y lactancia.

Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que, en niños menores de 10 años, Embarazo, Lactancia, Geriatria y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluirlo en ¼ vaso de agua.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias.

No se han descrito.

Sobredosis:

Medidas generales.

Otras propiedades atribuidas o demostradas:

No se presentan.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

Antes de administrar cada dosis se sugiere golpear al menos 10 veces el frasco contra la palma de la mano. Se recomienda la administración sublingual con la boca completamente limpia y libre de olores fuertes y cualquier sabor. Por lo que no se debe comer, beber, cepillarse los dientes ni fumar 20 minutos antes o después de la administración del medicamento. En caso de administrar el producto diluido en agua potable (1/4 vaso), este se debe retener en la boca durante 5 segundos garantizando el contacto sublingual. Se recomienda además evitar el contacto del cuentagotas, el interior de la tapa o el medicamento con las manos o labios.

Fecha de aprobación/revisión del texto: 30 de abril de 2020.

