



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO HOMEOPÁTICO

Nombre del producto: ALIVIHO®–TRAUMA, gotas sublinguales

Origen del material de partida: Vegetal y mineral

Forma farmacéutica: Gotas sublinguales

Grado de dilución o potenciación: 7-30 CH

Presentación: Estuche por un frasco de vidrio ámbar con tapa-gotero de PP con 15 ó 30 mL.

Titular, país: GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACÉUTICAS Y QUÍMICAS. LABIOFAM, La Habana, Cuba.

Fabricante, país: EMPRESA LABIOFAM CIENFUEGOS. UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE PRODUCCIONES FARMACÉUTICAS Y VETERINARIAS (UEB) LABORATORIO DE HOMEOPATÍA, Cienfuegos, Cuba.

Número de Registro Sanitario: H-18-022-V03

Fecha de Inscripción: 6 de marzo de 2018

Material de partida: Arnica montana 30 CH, Bellis perennis 15 CH, Bryonia alba 15 CH, Calcarea phosphorica 7 CH, Conium maculatum 9 CH, Hypericum perforatum 15 CH, Ledum palustre 30CH, Natrum sulfuricum 15 CH, Ruta graveolens 30 CH, Symphitum officinale 7 CH, Rescue remedy (Complejo de esencias florales).

Plazo de validez: 24 meses

Condiciones de almacenamiento: Protéjase de la luz. No refrigerar. Mantenga el frasco dentro del estuche.

Usos recomendados: Se recomienda como tratamiento analgésico auxiliar para dolores agudos como consecuencias de contusiones, hematomas, luxaciones, secuelas de caídas, golpes, fracturas y otros traumas mecánicos. La acción clínica de cada componente para esta indicación es la siguiente:

Componente	Coadyuva al alivio de:
<i>Arnica montana</i>	Dolor agudo, inflamación
<i>Bellis perennis</i>	Contracturas musculares, hematomas, dolor post-traumático, luxaciones.
<i>Bryonia alba</i>	Dolores articulares
<i>Calcarea phosphorica</i>	Torceduras, fracturas
<i>Conium maculatum</i>	Debilidad muscular
<i>Hypericum perforatum</i>	Dolores postraumáticos y post-operatorios, heridas, mordeduras
<i>Ledum palustre</i>	Hematomas, heridas no cicatrizadas, cortaduras, rasguños
<i>Natrum sulfuricum</i>	Cambios mentales y emocionales después de traumas,
<i>Ruta graveolens</i>	Esguinces, torceduras
<i>Symphitum officinale</i>	Dolores punzantes, lesiones oculares, fracturas
Rescue remedy (Complejo de esencias florales)	Situaciones traumáticas físicas y mentales

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes.

Precauciones:

El uso de este producto no excluye, sustituye o limita la aplicación de otros tratamientos. Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que en niños menores de 10 años, embarazo, lactancia, geriatría y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluirlo en ¼ vaso de agua.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

No manipular o administrar este producto en presencia de olores fuertes (perfume, tabaco, ambientadores, mentol, desinfectantes, etc.). No administrar junto con comidas o bebidas. Se recomienda, no fumar, beber, comer o lavarse los dientes 20 minutos antes y después de la administración. Mantener alejado de equipos electrónicos que generen ondas electromagnéticas fuertes (televisores, microondas, computadoras, celulares, radios, teléfonos inalámbricos, refrigeradores, etc). En caso de aparición de síntomas severos asociados a los usos recomendados u otros signos no relacionados, se debe acudir al médico.

Efectos indeseables:

No se han reportado hasta la fecha.

Posología y modo de administración:

Se recomienda, la administración de una dosis (5 gotas) 4 veces al día, durante al menos 5 días, sin exceder los 10 días de tratamiento. En dependencia de la severidad de los síntomas, puede incrementarse la frecuencia de administración hasta una dosis (5 gotas) cada 1 h. En la medida en que se alcance la mejoría de los síntomas debe disminuirse gradualmente la frecuencia de administración hasta alcanzar la posología terapéutica recomendada de 4 dosis diarias. En todos los casos durante el tratamiento deben respetarse los horarios de sueño.

Interacciones con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No se han reportado hasta la fecha.

Efectos sobre la conducción de vehículos / maquinaria;

No se han reportado hasta la fecha.

Uso en embarazo y lactancia.

Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que en niños menores de 10 años, embarazo, lactancia, geriatría y en personas sensibles (desórdenes hepáticos o alcoholismo), recomendamos diluirlo en ¼ vaso de agua.

Sobredosis:

No se han reportado hasta la fecha

Otras propiedades atribuidas o demostradas.

No se han reportado hasta la fecha.

Instrucciones de uso y manipulación del producto.

Antes de administrar cada dosis se sugiere golpear al menos 10 veces el frasco contra la palma de la mano. Se recomienda la administración sublingual con la boca completamente limpia y libre de olores fuertes y cualquier sabor. Por lo que no se debe comer, beber, cepillarse los dientes ni fumar 20 minutos antes o después de la administración del medicamento. En caso de administrar el producto diluido en agua potable (1/4 vaso), este se debe retener en la boca durante 5 segundos garantizando el contacto sublingual. Se recomienda además evitar el contacto del cuentagotas, el interior de la tapa o el medicamento con las manos o labios. Se sugiere dispensar previamente cada dosis (5 gotas) en la tapa del frasco y luego administrar debajo de la lengua.

Fecha de aprobación/revisión del texto: 6 de marzo de 2018.