

Síntomas comunes producidos por medicamentos

Las reacciones adversas a medicamentos con frecuencia se manifiestan como síntomas mal definidos, que se confunden con la patología de base o que simulan cualquier otra. Estas reacciones deterioran la calidad de vida de los pacientes, dificultan el diagnóstico y el manejo de las enfermedades y pueden conducir a una prescripción en cascada: tratar una reacción adversa a un medicamento con otro medicamento.

Atribuir la causalidad de un síntoma a un medicamento puede ser difícil, frecuentemente no se consigue hasta comprobar que se produce una mejoría con la retirada de este. También hay que tener en cuenta que las reacciones adversas pueden producir síntomas difíciles de relacionar con el mecanismo de acción. Por ejemplo, la hiponatremia por antidepresivos puede manifestarse como agitación o el hipotiroidismo por amiodarona como distimia.

La AMF (Asociación Gallega de Medicina Familiar y Comunitaria) ha publicado un artículo donde se revisan los síntomas que se ven frecuentemente en la consulta y su posible relación con fármacos de uso habitual en Atención Primaria (AP). Además de los síntomas causados por los medicamentos, hay que considerar también aquellos que pueden producirse como consecuencia de la retirada de estos, especialmente si es brusca.

Disponible en:

<http://comcordoba.com/wp-content/uploads/2017/06/SC3ADntomas-comunes-producidos.pdf>

Javier Garjón Parra, Marcelo Domínguez Cantero. **Síntomas comunes producidos por medicamentos.**
AMF 2017;13(6):340-346

La Habana, 14 de agosto de 2017